

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Medicamentos  
Veterinarios



¡Comprometidos  
con el  
*Bienestar*  
de sus Animales!



2241-3636 | 8890-5858 • [info@navetsa.com](mailto:info@navetsa.com) • San Miguel, Santo Domingo, Heredia

www.navetsa.com



# Presentación

**NAVET Internacional S.A.** es una empresa que comercializa medicamentos veterinarios y accesorios tanto para el sector pecuario como para el cuidado de mascotas.

Para NAVET S.A. sus clientes son lo más importante. Es por esta razón que brindamos un servicio personalizado a través de nuestros representantes de ventas y personal técnico altamente calificado. A su vez cuentan con nuestra atención telefónica y herramientas en línea, de esta forma estamos siempre accesibles para brindarle soluciones a sus necesidades.

 **2241-3636**  **8890-5858**

 **Navet Internacional S.A**  **navet\_internacional**  **[info@navetsa.com](mailto:info@navetsa.com)**  **[www.navetsa.com](http://www.navetsa.com)**

En esta oportunidad, nos es grato poner a su disposición la nueva versión del **CATÁLOGO DE PRODUCTOS**, seguros de que le facilitará realizar sus pedidos.

Atentamente,  
Equipo de Colaboradores



## ➔ Misión

Colaborar con el bienestar y salud animal, proporcionando productos farmacéuticos y accesorios para animales de la mejor calidad; conservando con respeto, lealtad y ética profesional, las mejores relaciones con nuestros clientes, proveedores y colaboradores.

## ➔ Visión

Ser el líder de la distribución de productos veterinarios y accesorios para animales en Costa Rica, brindando los mejores productos, precios y servicio del mercado.

## Nuestra Empresa


### Distribuidor de los laboratorios



### Distribuidor de los accesorios



### Fabricante de los accesorios





**DISTRIBUYE:**



**Comprometidos con el bienestar de sus animales**

## GALMEDIC Desparasitantes internos y externos

### IVERM

**Indicaciones:** para el tratamiento de infestaciones parasitarias. En bovinos: gastrointestinales, pulmonares, parásitos externos, piojos, ácaros de la sarna, tórsalos y garrapatas. En ovinos y caprinos: gastrointestinales, pulmonares, gusano de la cabeza, ácaros de la sarna. En porcinos: gastrointestinales, pulmonares, lombriz del riñón, piojos, ácaros de la sarna. Ayuda al control de garrapatas y ácaros cuando forma parte de un programa continuo.

**Vía de administración:** subcutánea exclusivamente delante o detrás de la paleta.

**Fórmula:** Ivermectina al 1%

**Dosis:** bovinos, ovinos y caprinos 1ml cada 50kg de peso; porcinos 1ml cada 33kg de peso.

**95002** IVERM 1% 20ml

**95003** IVERM 1% 50ml

**95004** IVERM 1% 200ml

**95005** IVERM 1% 500ml



### IVERM L.A.

**Indicaciones:** antiparasitario interno - externo de Larga Acción y amplio espectro, con una baja posología y un amplio margen de seguridad. Para el tratamiento de infestaciones parasitarias. En bovinos: gastrointestinales, pulmonares, parásitos externos, piojos, ácaros de la sarna, tórsalo y garrapatas. En ovinos y caprinos: gastrointestinales, pulmonares, gusano de la cabeza, ácaros de la sarna. En porcinos: gastrointestinales, pulmonares, lombriz del riñón, piojos, ácaros de la sarna. Ayuda al control de garrapatas, ácaros cuando forma parte de un programa continuo. Esta acción ultra rápida y fuerte puede ser utilizada para el tratamiento de animales muy parasitados.

**Vía de administración:** subcutánea o intramuscular.

**Fórmula:** Ivermectina al 1% de Larga Acción.

**Dosis:** bovinos, ovinos y caprinos 1ml cada 50kg de peso; porcinos 1ml cada 33kg de peso.

**95011** IVERM L.A 20ml

**95012** IVERM L.A 50ml

**95013** IVERM L.A 200ml

**95014** IVERM L.A 500ml



### IVERM PLUS

**Indicaciones:** desparasitante para bovinos. Solución inyectable al 3,15% de Ivermectina, esta es una de las drogas más potente utilizada para el tratamiento y control de las infestaciones parasitarias externas e internas de los animales, actúa contra parásitos gastrointestinales y pulmonares tanto sobre la forma adulta como larvas. También contra el tórsalo (*Dermatobia hominis*) de los bovinos, piojos, ácaros de la sarna y garrapatas. Posee un amplio espectro de eficacia y a la vez un amplio margen de seguridad y baja dosificación, es el producto ideal para el control de los parásitos en el ganado bovino.

**Vía de administración:** subcutánea exclusivamente.

**Fórmula:** Ivermectina al 3,15%

**Dosis:** bovinos únicamente 1ml cada 50kg de peso.

**95016** IVERM PLUS (3,15) 20ml

**95017** IVERM PLUS (3,15) 50ml

**95019** IVERM PLUS (3,15) 200ml

**95020** IVERM PLUS (3,15) 500ml



## EQUIMECTIN

**Indicaciones:** Está indicado en todos los casos de parasitosis gastrointestinales, pulmonares y cutáneas de los equinos. Es altamente efectivo contra el gusano del cuajo (Gasterófilos) y los estadios arteriales de Strongylus.

**Fórmula:** Ivermectina en gel (1.2%)

**Dosis:** el contenido de una jeringa es suficiente para el tratamiento de un equino adulto de hasta 600 Kg. a la dosis recomendada de 200 mcg de Ivermectina por Kg. de peso vivo. Para animales de peso menor se debe correr la rueda en la escala graduada hasta la marca correspondiente al peso del animal, luego destapar la cánula y depositar el producto en la boca dejando que el animal degluta naturalmente.

**95024** EQUIMECTIN PASTA 10g



## EQUICUANTEL

**Indicaciones:** Para el tratamiento de infestaciones parasitarias gastrointestinales, pulmonares y cutáneas de los equinos. Con efecto escolicida, tenicida, nematocida, ectoparasiticida y contra cisticercos viables, favorece la eliminación de huevos, larvas, estadios jóvenes y etapas adultas de los parásitos.

**Fórmula:** Ivermectina + Praziquantel

**Dosis:** Administrar el contenido de una jeringa para el tratamiento de un equino de 600 Kg. Para animal de menor peso se debe correr la rueda en la escala graduada hasta la marca correspondiente al peso del animal, luego destapar la cánula y depositar el producto en la boca dejando que el animal degluta naturalmente.

**95025** EQUICUANTEL JERINGA 10g



## PARAMAS

**Indicaciones:** Está indicado para el tratamiento de las infestaciones parasitarias gastrointestinales y pulmonares en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y aves. Tiene acción larvicida, ovicida y vermificada.

**Vía de administración:** Oral, mezclado con la ración diaria de alimento.

**Fórmula:** Fenbendazol al 4%

**Dosis:** 10 g por cada 80 Kg de peso vivo, en caso de infestación parasitaria muy elevada o en tratamientos de engorde tratar a los animales con un intervalo de 6 semanas. Porcinos reproductores: pueden ser tratados 7 días antes del cruzamiento, la desparasitación puede realizarse por lo menos 6 veces al año. Porcinos en gestación: Pueden ser tratados 30 días antes del parto.

Aves: 1 sobre por cada 4Kg de alimento.

**95021** PARAMAS SOBRE 10g



## IVERM ANTEL PLUS

**Indicaciones:** IVERM-ANTEL PLUS masticable, es efectivo contra estadios larvarios tisulares de *D. immitis* que se desarrollan hasta un mes (30 días) después de la infección y, consecuentemente, eficaz en el tratamiento y control de ascárides (*T. Canis*, *T. leonina*) y vermes dentados caninos (*A. caninum*, *A. braziliense*, *U. stenocephala*). Para uso en perros en la prevención de la dirofilariasis canina (gusano del corazón) eliminando el estadio tisular de la larva (*Dirofilaria immitis*) hasta un mes (30 días) después de la infección y para el tratamiento y el control de las infecciones por ascárides (*Toxocara canis*, *Toxocaris leonina*) vermes dentados (*Ancylostoma caninum*, *A. braziliense*, *Uncinaria stenocephala*).

**Presentaciones:** Tabletas para caninos de hasta 11kg (1g), caninos de 12kg-22kg (2g) y caninos de 23kg-45kg (4g).

**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** Cada 100 g de tableta contiene 6.8 mg de ivermectina y 16.3 g de Pamoato de Pirantel.

**Dosis:** Las tabletas masticables de IVERM-ANTEL PLUS deben ser administradas por vía oral a la dosis mínima recomendada de 6,0 µg de Ivermectina y 5 mg de Pirantel (en forma de Pamoato) por kilogramo de peso vivo a intervalos mensuales.

**95125** IVERM ANTEL PLUS HASTA 11KG  
IVERM ANTEL PLUS 12-22KG  
IVERM ANTEL PLUS 23-45KG



## **GALMEDIC**

### **Desparasitantes externos**

#### **FIPECTO POUR-ON**

Indicaciones: antiparasitario externo para bovinos. Solución a base de Fipronil, insecticida y garrapaticida, indicado para el tratamiento de las infestaciones causadas por garrapatas, tórsalos, piojos masticadores y piojos chupadores.

Fórmula: Fipronil

Dosis: Aplicar a lo largo del lomo desde la región de la cruz hasta la región dorsal a razón de 1 ml. Por cada 10 kg de peso.

**95026** FIPECTO POUR-ON 250ml

**95023** FIPECTO POUR-ON 500ml

**95022** FIPECTO POUR-ON litro



**GALMEDIC**  
**Desparasitantes externos**

# GALMEDIC

## Desparasitantes externos

### AFOXOPET

**PRODUCTO  
NUEVO**

**Indicaciones:** Ectoparasitocida masticable para perros a base de Afoxolaner, para el control de parásitos externos como pulgas, garrapatas y ácaros en perros adultos y cachorros con más de 8 semanas de edad, pesando como mínimo 2 kg de peso corporal. Está indicado para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) y tratamiento y control de garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Amblyomma americanum*, *Ixodes holocyclus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis longicomis*). Y ácaros (*Demodex Canis*, *Sarcoptes Scabeji*).

**Presentación** Tabletas masticables de 0.5 g, 1.25 g, 3g y 6g

**Vía de administración:** Oral

**Fórmula:** Cada 100 g de tableta contiene 2.267g de Afoxolaner

**Dosis:** Las tabletas masticables de AFOXOPET deben ser administradas por vía oral a la dosis mínima recomendada de 2,5 mg de Afoxolaner por kilogramo de peso vivo a intervalos mensuales.

- 95120 AFOXOPET 2 A 4KG
- 95121 AFOXOPET 4.1 A 10KG
- 95122 AFOXOPET 10.1 A 25KG
- 95123 AFOXOPET 25.1 a 50kg



**GALMEDIC**  
Desparasitantes externos

## TRIMEDIC FORTE

**Indicaciones:** Infecciones causadas por microorganismos sensibles al Trimetoprim y a la Sulfadiazina tales como: Infecciones respiratorias:

Neumonías y bronquitis infecciosa e infecciones secundarias de las neumonías causadas por virus. Infecciones digestivas: diarreas provocadas por Colibacilos y Salmonellas. Infecciones genitales: Vaginitis, metritis y como preventivo de las infecciones post parto. Infecciones urinarias: Cistitis, uretritis y nefritis. Otras infecciones: Heridas del casco, heridas infectadas, septicemias, agalaxia bacteriana de los porcinos y como preventivo en los traumatismos e intervenciones quirúrgicas.

**Via de administración:** Intramuscular profunda

**Fórmula:** Trimetoprim + Sulfadiazina

**Dosis:** Hasta 150 Kg. de peso: 5 ml. De 150 a 300 Kg. de peso: 10 ml.

De 300 a 400 Kg. de peso: 15 ml. Animales con más de 450 Kg. de **peso:** aumentar 1 ml cada 30 Kg. de peso. En infecciones graves la dosis puede ser aumentada en 1,5 ml por cada 30 Kg de peso.

95045 TRIMEDIC FORTE 100ml

95043 TRIMEDIC FORTE 15ml



## GALMEDIC Antibióticos

### PENTAGAL ESTREPTO 6.000.000

**Indicaciones:** es una combinación de 5 antibióticos y un antiinflamatorio, analgésico, antipirético y antihistamínico, que alcanza niveles terapéuticos rápidos y prolongados en la sangre, con un amplio espectro de acción. Está indicado en todos los casos de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Penicilina y a la Estreptomicina. Como preventivo en caso de traumatismo y en intervenciones quirúrgicas. También en la prevención de infecciones secundarias en enfermedades causadas por virus.

**Vía de administración:** Intramuscular profunda.

**Fórmula:** Cada frasco con polvo contiene: Penicilina G procaína 3.000.000 u, Penicilina G Sódica 1.500.000 u, Penicilina G Potásica 1.500.000 u, Dihidroestreptomicina base (Sulfato) 1.250 mg, Estreptomicina 1.250 mg, Dipirona 1000 mg.

Cada frasco con diluyente contiene:

Clorfeniramina maleato 40 mg. Excipiente c.s.p. 15 ml.

**Dosis:** Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos: 2,5 ml por cada 50kg de peso vivo. Un frasco reconstituido equivale para un animal de 400kg aprox.

**95085** PENTAGAL ESTREPTO  
6.000.000 20ML



### CEFTIGAL

**Indicaciones:** Puede ser utilizado con eficacia en procesos neumónicos en porcinos y bovinos. Para el tratamiento de enfermedades respiratorias de los equinos y para reducir la mortalidad temprana en pollitos de 1 día de edad (colibacilosis), asociada a variedades de Escherichia coli sensibles al Ceftiofur.

**Vía de administración:** Bovinos, porcinos y equinos: Intramuscular. Pollitos de 1 día de edad: Subcutánea en la zona del cuello.

**Fórmula:** Ceftiofur Sódico

**Dosis:** Bovinos: 1 - 2 mg de Ceftiofur por Kg de peso vivo (correspondiente a 1 - 2 ml del producto reconstituido por cada 50 Kg de peso vivo). Porcinos: 3 - 5 mg de Ceftiofur por Kg de peso vivo (correspondiente a 1 - 1,5 ml del producto reconstituido por cada 16 Kg de peso vivo). Equinos: 2 - 4 mg de Ceftiofur por Kg de peso vivo (correspondiente a 1 - 2 ml del producto reconstituido por cada 25 Kg de peso vivo). Pollitos de 1 día de edad: 0,08 - 0,2 mg de Ceftiofur. (1 ml del producto reconstituido sirve para tratar de 250 a 625 pollitos de 1 día de edad). 1 frasco por 4 g alcanza para dosificar 20.000 - 50.000 pollitos. Administrar una sola vez.

**95039** CEFTIGAL 80 ml



## DIMINOXI VET

**INDICACIONES:**

Combinación de un Anti parasitario Interno, Antibiótico y Dipirona específico para Bovinos, Caprinos y Ovinos. Es altamente efectivo contra la anaplasmosis y piroplasmosis.

**Vía de administración:** Intramuscular profundo.

**Composición:** Cada 30mL contiene 4.950 mg de Oxitetraciclina 2.250 mg Diminazeno Diaceturato y 11.475 mg de Dipirona.

**Dosis:** 1 mL por cada 15 Kg de peso vivo.

**Presentación:** Frasco de 30 mL para reconstituir.

950040 30 mL



## OXITOCINA INYECTABLE

### INDICACIONES:

Estimulación uterina en parto asistido. Retención de placenta, previa estimulación del útero con estrógenos, Hemorragia post parto, como ayuda a la bajada de la leche en vacas de ordeño, agalactia y MMA en las cerdas.

### COMPOSICIÓN:

Oxitocina sintética 20 UI.

Excipientes c.s.p. 1 ml.

### ADMINISTRACION Y DOSIS:

Subcutánea. Intramuscular. Intravenosa.

### DOSIS:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Vacas y yeguas:</b>             | <b>2 a 5 mL.</b>   |
| <b>Cerdas de más de 250 kg:</b>    | <b>3 mL.</b>       |
| <b>Cerdas con menos de 250 kg:</b> | <b>1 a 2 mL.</b>   |
| <b>Ovejas:</b>                     | <b>1 mL.</b>       |
| <b>Perras y gatas:</b>             | <b>0,2 a 1 mL.</b> |

En la agalactia de perras se puede hacer instilación nasal 3 a 4 veces al día.

**En vacas lecheras y como auxiliar en el tratamiento de la mastitis:** Después de ordeñar el cuarto afectado aplicar 2 a 5 mL por vía intramuscular, esperar 5 a 10 minutos y ordeñar nuevamente, luego hacer la infusión intramamaria específico contra la mastitis.

### PRESENTACIÓN: Frascos de

**95080** 10 mL

**95081** 50 mL

**95084** 250 mL



## VITFOS ADE B12

**Indicaciones:** Avitaminosis. Convalecencias de procesos infecciosos o parasitarios, preñez, inapetencia por efectos de traslados y vacunaciones, stress, indigestión crónica o sobrecarga del rumen.

**Vía de administración:** Bovinos, equinos, caprinos, ovinos y porcinos: Vía Intramuscular. Aves: Vía Oral.

**Fórmula:** Vitamina A 1.020.000 UI, Vitamina D3 150.000 UI, Vitamina E 200 UI, Nicotinamida, Vitamina B12, Vitamina B6, Vitamina B2, Vitamina B1, Fosforilcolamina.

**Dosis:** Bovinos, caprinos, equinos, porcinos y ovinos: (animales adultos) 5 ml. (Animales jóvenes) 3 ml. Aves: 1 ml por cada 1 litro de agua de bebida.

**95053** VITFOS ADE-B12 100ml

**95054** VITFOS ADE-B12 250ml



## VITAFER

**Indicaciones:** complemento alimenticio multivitamínico y mineral. Indicado para estados de convalecencia, recuperación por trastornos de enfermedades infecciosas y parasitarias, prevención y tratamiento de anemias, tónico y hematopoyético, estimulante del apetito y crecimiento. Además actúa como virgórico y fortificante en equinos sujetos a esfuerzos intensos y estrés.

Puede ser aplicado en otras especies como bovinos, porcinos y caninos generando óptimos resultados.

**Vía de administración:** Oral o mezclado con el alimento concentrado.

**Fórmula:** Citrato de hierro amoniacal+Sulfato de cobre+vitamina B1-B2-B6-B12+ácido fólico+Pantotenato de calcio+Nicotinamida+ Sulfato de Cobalto+Excipientes.

**Dosis:** Bovinos y Equinos: 40ml por día. Terneros y Potrillos 20ml por día. Porcinos: 5ml por día. Caninos: 5 ml-15ml por día.

**95058** VITAFER LITRO



## GALMEDIC Reconstituyentes vitamínicos Mineralizantes

### FOSGAL COMPUESTO

**Indicaciones:** En el tratamiento de trastornos metabólicos causados por deficiencias agudas o crónicas de fósforo. En el síndrome de afosforosis. En la prevención de la enfermedad en zonas de Botulismo endémico. En caso de raquitismo y Osteomalacia. Como coadyuvante de la calcioterapia. En el tratamiento del Lumbago del caballo. En el tratamiento de la infertilidad de las vacas y para mejorar la eficiencia genética en los reproductores machos. En la preparación de animales de exposición. Para aumentar el rendimiento de los caballos de carrera. Como tónico y reconstituyente en la convalecencia.

**Vía de administración:** Intravenosa, intramuscular y subcutánea.

**Fórmula:** Fosfinato de sodio, Vitamina B12, Selenito de sodio.

**Dosis:** Equinos y bovinos: 5 - 20 ml. Potrillos y terneros: 5 - 10 ml. Porcinos: 1 - 10 ml. Ovinos y caprinos: 2,5 ml. Caninos y felinos: 0,5 - 5 ml. En animales sanos utilizar la mitad de la dosis terapéutica.

95055 FOSGAL COMPUESTO 100ml

95056 FOSGAL COMPUESTO 250ml



### SUERO GALMEDIC

**Indicaciones:** En caso de deshidratación aguda causada por enfermedades del aparato digestivo. En la diarrea de los terneros lactantes. Acetonemia, intervenciones quirúrgicas, partos dificultosos y esfuerzos extraordinarios. En el tratamiento de enfermedades infecciosas de cualquier tipo. En la recuperación de animales caquécticos o muy debilitados o agotados. Para la reposición de líquidos y energía en los animales en entrenamiento.

**Vía de administración:** Intravenosa, subcutánea, intraperitoneal.

**Fórmula:** Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Nicotinamida, Glucosa, Cloruro de Sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio, Cloruro de magnesio

**Dosis:** Bovinos y equinos: 1.000 a 2.000 ml. Terneros, ovinos y porcinos: 500 ml. Caninos y felinos: Por vía intravenosa: 30 - 50 ml. Por vía subcutánea o intraperitoneal: 100 - 250 ml. La administración por vía intravenosa debe ser efectuada lentamente

95042 SUERO GALMEVIT 500ml



### SELADE FOSFORADO

**Indicaciones:** Compuesto mineral vitamínico formulado con aporte de Fósforo, Calcio, Magnesio, Selenio y Vitaminas A, D y E que favorece: la organogénesis, la coagulación; el índice de crecimiento, logrando un aumento diario de peso; la menor incidencia de partos distócicos; el mantenimiento de la estructura ósea normal; la integridad de los epitelios; acelera la involución uterina post-parto; reduce el porcentaje de lesiones podales; contrarresta la incidencia de retención placentaria; estimula la actividad cíclica del ovario; potencia la fertilidad y aumenta las probabilidades de concepción.

**Vía de administración:** Subcutánea.

**Fórmula:** Selenito de Sodio + Vitamina A (Palmitato) + Vitamina D3 + Vitamina E + Hipofosfito de Magnesio + Borogluconato de Calcio.

**Dosis:** 5 a 10 ml por animal.

95082 SELADE FOSFORADO 100ml

95083 SELADE FOSFORADO 250ml



## GALERFIN

**Indicaciones:** antihistamínico con acción antialérgica rápida. Su efecto sedante sobre el paciente y sus escasos efectos colaterales adversos le confiere una amplia gama de aplicaciones clínicas. Urticaria, eccemas, dermatitis y prurito de origen alérgico. Fotosensibilidad, infosura, shock anafiláctico. Reacciones de sensibilidad a alimentos. Picaduras de insectos, mordeduras de serpientes.

Como tratamiento de apoyo en mastitis, metritis, pododermatitis, etc.

**Vía de administración:** Intramuscular - Intravenosa.

**Fórmula:** Clorfeniramina maleato

**Dosis:** Equinos y bovinos: 5 - 10 ml. por día. Potrillos y terneros: 3 - 5 ml. por día. Ovinos y porcinos: 2 - 10 ml. por día. Caninos y felinos: 0,2 - 2 ml. por día.

**95070** GALERFIN 20 ML



## DESALGINA

**Indicaciones:** analgésico-antipirético-antiespasmódico-antirreumático. Para combatir el dolor causado por cólicos y espasmos viscerales. En la dilatación aguda del estómago del caballo. Artritis aguda y crónica. Dolores musculares y articulares. Neuralgias, Neuritis, Tendovaginitis. Para mitigar el espasmo del esófago en la obstrucción por cuerpos extraños. En estados febriles de cualquier origen.

**Vía de administración:** Intravenosa o intramuscular profunda.

**Fórmula:** Dipirona.

**Dosis:** Equinos y Bovinos: 20-60 ml. Ovejas y Cabras: 1-5 ml. Cerdos: 10-30 ml. Perros: 0.5-2 ml.

**95090** DESALGINA (DIPIRONA) 50ml

**95091** DESALGINA (DIPIRONA) 100ml



**FLUNIMIN INYECTABLE**

**Indicaciones:**

**Bovinos:** Tratamiento del dolor agudo causado por cirugías, heridas y lesiones del aparato locomotor. Como complemento de la terapia específica del síndrome de la vaca caída, otras afecciones con inflamación aguda y síndrome febril.

**Equinos:** Alivio de lesiones inflamatorias del aparato locomotor como miositis, osteítis, artritis, tendinitis, sinovitis. Alivio del dolor visceral asociado a cólicos y como tratamiento complementario de neumopatías,

**Porcinos:** Tratamiento del síndrome metritis- mastitis- agalaxia (MMA), inflamaciones agudas y crónicas del aparato locomotor, síndrome febril, dolor agudo.

**Caninos:** Alivio de lesiones inflamatorias agudas del aparato locomotor.

**COMPOSICION:** Flunixin meglumina equivalente a Flunixinina 5 g. Excipientes c.s.p 100 ml.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS**

**Bovinos y equinos:** intramuscular e intravenosa.

**Porcinos:** intramuscular.

**Caninos:** subcutánea, intramuscular e intravenosa.

| Especie         | Dosis                | Frecuencia    | Duración de tratamiento         |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>BOVINOS</b>  | 2 mL / 45 Kg         | Cada 24 horas | Máximo 5 días                   |
| <b>EQUINOS</b>  | 1 mL / 45 Kg         | Cada 24 horas | Máximo 5 días                   |
| <b>PORCINOS</b> | 2 mL / 45 Kg         | Cada 12 horas | Máximo 1 día ( 2 aplicaciones ) |
| <b>CANINOS</b>  | 0.2 a 0.4 mL / 10 Kg | Cada 24 horas | Máximo 3 días                   |

**PERIODO DE RETIRO:**

Carne: 20 días

Leche: 48 horas

**PRESENTACIONES:** Frasco de

**95057** 50 ML



**GALMEDIC**  
**Antiinflamatorio**

## DIURÉTICO GALMEDIC

**Indicaciones:** Está particularmente indicado cuando se necesita un potencial diurético mayor que el obtenido cuando se emplean los diuréticos comunes. En la reabsorción de acumulaciones de líquidos no inflamatorios de origen cardíaco, renal, o de otro género. Insuficiencia cardíaca congestiva. Edemas pulmonares y bronquiales. Edema del prepucio, escroto y extremidades. Edema Fisiológico de la ubre (post parto). En edemas causados por inflamaciones agudas de los tejidos ya sean de origen infeccioso, traumático y alérgico. Como coadyuvante en el tratamiento de la pododermatitis aguda o envaramiento de los equinos. Para prevenir el edema de glotis en casos de mordeduras de víboras.

**Vía de administración:** Intramuscular - Intravenosa.

**Fórmula:** Furosemida

**Dosis:** Equinos 5 - 10 ml. una a dos veces por día. Bovinos: 5 - 10 ml. una vez por día. Caninos y felinos: 0,25 - 0,50 ml. por cada 5 Kg. de peso. En casos graves o rebeldes esta dosis puede ser aumentada.

**Contraindicaciones:** Está contraindicado en casos de hipovolemia, estado de deshidratación y embarazo en el primer trimestre. No utilizar en pacientes con anuria.

**95050** DIURETICO GALMEDIC 10ml



## ANTIVAM

**Indicaciones:** Control de murciélagos hematófagos. Antivam es una pasta formulada con Warfarina, que aplicada en forma tópica sobre la herida es ingerida por murciélagos hematófagos produciendo la muerte de estos roedores debido a la hemorragia interna ocasionada por el anticoagulante.

**Vía de administración:** Uso tópico.

**Fórmula:** Warfarina.

**Dosis:** Verter una cantidad suficiente de pasta sobre la herida producida en el cuerpo del animal que fue atacado por el roedor hematófago. La aplicación se realizará cuantas veces sea necesaria, preferentemente al final de la tarde.

**Contraindicaciones:** No aplicar el producto en heridas localizadas en las tetas de las hembras en lactación. Evitar el contacto con ojos, boca y pelo. Mantener el envase perfectamente tapado. Una vez utilizado el producto por completo, desechar el envase. Evitar guardar el producto con alimentos. En caso de ingestión accidental, inducir el vómito, acudir al médico con la caja del producto o llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones 2223-1028.

**95100** ANTIVAM 50 GRS



## CLORHEX SPRAY

**Indicaciones:** Fungicida y bactericida de amplio espectro. Antiséptico para lavado de heridas de piel, mucosas y preparación de campos quirúrgicos. Desinfectante y limpieza de superficies en consultorios y quirófanos.

**VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:** Uso tópico. Limpiar el área afectada antes del tratamiento. Aplicar la Clorhex Spray cubriendo la zona afectada. Para el lavado de heridas y limpieza de piel y mucosas aplicar una vez por día. La duración del tratamiento estará dada por el Médico Veterinario.

**Fórmula:** Cada 100 ml. contienen: Clorhexidina Digluconato 0.5 g. Excipientes c.s.

**Presentación:** Frasco de

**95035** 150 ML



## TRIDERM GOTAS

**Indicaciones:** (Otitis) Inflamación aguda o crónica y dolorosa de la piel del conducto auditivo externo, producida por hongos y/o bacterias.

**VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:**

| Afección         | Dosis       | Frecuencia    | Duración de tratamiento |
|------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| Otitis ext       | 2 a 4 gotas | Cada 12 horas | 7 días                  |
| Lesiones de piel | 2 a 4 gotas | Cada 12 horas | 5 días                  |

**COMPOSICIÓN:** Triancinolona Acetonida 0.1 g; Sulfato de Neomicina 0.3 g; Tiabendazol 4 g; Excipientes csp 100 mL..

Excipientes c.s.

**Presentación:** Frasco gotero

**95046** 15 ML





## FIPECTO PLATA AEROSOL

**Cicatrizante, antimicrobiano y antiparasitario externo.**

**Indicaciones:** Fipecto Plata Aerosol está indicado para aplicación en piel en todo tipo de heridas traumáticas o quirúrgicas como castraciones, corte de rabo, descornes, y en todo tipo de heridas para acelerar la cicatrización y proteger contra suciedad e insectos.

**FÓRMULA: Fórmula: Cada 100 mL contienen:**

- Fipronil.....0.32 g.
- Sulfadiazina de Plata.....0.09 g.
- Aluminio.....3.1 g.
- Vehículo..... C.S.

**Presentación:** Frasco Spray de 250 mL

**95030** Fipecto plata aerosol 250mL



# Virbac

SALUD ANIMAL

DISTRIBUYE:



Comprometidos con el bienestar de sus animales

# VIRBAC

## Desparasitantes internos

### ENDOARD CLINIC PACK

**Indicaciones:** es un endoparasitico de amplio espectro, que funciona contra estadios maduros e inmaduros de los principales parásitos del perro incluyendo microfilarias de *Dirofilaria immitis*, *Ancylostoma caninum* y *Giardia canis*.

**Via de administración:** oral.

**Fórmula:** febantel, pirantel, praziquantel e ivermectina

**Dosis:** Para nematodos y cestodos administre 1 sola toma según el peso de animal. Existen presentaciones para 2.5, 10 y 30 kg de peso. Se recomienda una segunda toma quince días después para cortar el ciclo biológico del parásito. A criterio del Médico Veterinario. Para la prevención de microfilarias de *Dirofilaria immitis* o "gusano del corazón", se recomienda un tratamiento mensual durante toda la vida de la mascota. A criterio del Médico Veterinario.

Para el control de giardiasis recomienda una toma cada 24 horas durante 2 ó 3 días. A criterio del Médico Veterinario.

**Advertencias:** Ocasionalmente se ha reportado diarrea, depresión, incoordinación, temores, salivación y vómito. Se recomienda para cachorros desde las 4 semanas de edad y mayores a un kilo de peso. Después de administrar Endogard, es recomendable proporcionar alimento para disminuir la irritación gástrica.

- 60750** ENDOGARD 2.5 BLISTER 2und
- 60751** ENDOGARD 10 BLISTER 2und
- 60752** ENDOGARD 30 BLISTER 2und
- 60754** ENDOGARD 2.5 CAJA 24 TABLETAS
- 60755** ENDOGARD 10 CAJA 24 TABLETAS
- 60756** ENDOGARD 30 CAJA 24 TABLETAS



### MILPRO GATOS

| Composición       | Contenido |
|-------------------|-----------|
| Milbemicina oxima | 16 mg     |
| Praziquantel      | 40 mg     |

**Acción:** Antiparasitario interno

**Indicaciones:** Indicado en el tratamiento de las infestaciones combinadas de cestodos inmaduros y adultos (*Taenias*) y nemátodos (gusanos redondos) de las especies *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Echinococcus multilocularis*, *Ancylostoma tubaeforme* y *Toxocara cati*. El producto puede ser usado también en la prevención del gusano del corazón (*Dirofilaria immitis*) si el tratamiento concomitante contra cestodos también está indicado. En casos en que se requiera prevención contra el gusano del corazón y al mismo tiempo tratamiento contra taenias, MILPRO 16 mg/40 mg puede reemplazar el tratamiento monovalente para la prevención del gusano del corazón.

**Dosis:** La dosis mínima recomendada es de 2 mg de milbemicina oxima y 5 mg de Praziquantel por kilogramo, como dosis única. MILPRO® GATOS. 16mg/40 mg Antiparasitario interno de amplio espectro para Gatos de más de 2 Kg. de peso Dependiendo del peso del gato, la dosis práctica se muestra en la siguiente tabla:

| Peso    | Tableta        |
|---------|----------------|
| 2-4 kg  | 1/2 tableta    |
| 4-8 kg  | 1 tableta      |
| 8-12 kg | 1 1/2 tabletas |

**Via de Administración:** Oral, puede administrarse con o después del alimento.

**Contraindicaciones:** No utilizar en gatos con peso inferior a 2 Kg., ni menores a 6 semanas de edad, no usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas. Pueden observarse reacciones adversas, especialmente en gatos jóvenes, tales como letargia, ataxia, tremor muscular, emesis y diarrea. No se recomienda su uso en gatos severamente debilitados o con compromiso renal o hepático. El producto puede ser administrado en gatas lactantes, gatas preñadas y gatas reproductoras, a recomendación del Médico Veterinario.

**Modo de Aplicación:** Tabletas

**Presentación:** Caja por 4 tabletas

**60015** MILPRO



## MILPRO GATITO

**Indicaciones:** está indicado para el tratamiento de infestaciones mixtas de céstodos (tenias) y nemátodos (gusanos redondos) de las especies *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp, *Echinococcus multilocularis*, *Ancylostoma tubaeforme* y *Toxocara cati*. El producto también puede ser usado en la prevención de gusano de corazón (*Dirofilaria immitis*) si el tratamiento concomitante contra céstodos también está indicado.

**Composición:** Cada tableta contiene: Milbemicina oxima 4 mg y Praziquantel 10 mg

**Administración y dosis:** Vía de administración Oral, puede administrarse con o después del alimento. La dosis mínima recomendada es de 2 mg de milbemicina oxima y 5 mg de praziquantel por kg de peso, como dosis única. Dependiendo del peso del gato, la dosis práctica se muestra en la siguiente tabla:

| Peso       | Tableta |
|------------|---------|
| 0.5 a 1 kg | ½       |
| >1 a 2 kg  | 1       |

**Presentación:** Caja por 4 tabletas

**60014** MILPRO GATITOS 4 mg / 10 mg



## VIRBAMEC L.A.

**Indicaciones:** Para el control y tratamiento de parásitos redondos gastrointestinales y pulmonares.

Para el control de parásitos externos como piojos, algunas moscas chupadoras, adultas y formas larvianas, algunas garrapatas y ácaros de la sarna.

Para la prevención de gusaneras del ombligo de los becerros recién nacidos y de las heridas por castración.

**Vía de administración:** vía subcutánea o I.M.

**Fórmula:** Ivermectina 1 gr.

**Dosis:** Bovinos, ovinos y caprinos: 1 ml por cada 50 kg de peso. Cerdos: 1 ml por cada 33 kg de peso.

**60027** VIRBAMEC L.A 50ML

**60028** VIRBAMEC L.A 200ML

**60029** VIRBAMEC L.A 500ML



# VIRBAC

## Desparasitantes internos y externos

### VIRBAMEC PLATINUM

**Indicaciones:** Para el control y tratamiento de gusanos redondos (gastrointestinales y pulmonares), moscas, piojos, ácaros de la sarna y GARRAPATAS. Está indicado también en la prevención de gusaneras del ombligo de los becerros recién nacidos y de las heridas por castración.

**Vía de administración:** Exclusivamente por vía subcutánea en el área de la escápula (paleta).

**Fórmula:** Ivermectina 3,15 gr.

**Dosis:** 1 ml por cada 50 kilogramos de peso.

**60016** VIRBAMEC PLATINUM 3,15% 500 ML



### EFFIPRO BOVIS

**Indicaciones:** para el tratamiento y control de parásitos externos de los bovinos como Garrapatas, Mosca del cuerno, Piojos masticadores, Piojos chupadores, Miasis nodular.

Con colorante color azul que marca los animales tratados por aproximadamente 5 días.

**Vía de administración:** a lo largo del lomo del animal en la línea que va desde la cruz hasta la base de la cola.

**Fórmula:** Fipronil 1%

**Dosis:** 1 ml por cada 10 kg de peso, correspondiente a 1 mg de Fipronil por kilogramo de peso.

**60007** EFFIPRO LITRO

**60035** EFFIPRO 5 LITROS (OFERTA)



**VIRBAC**  
Desparasitantes externos

## RILEXINE PALATABLE

**Indicaciones:** Para uso en perros, gatos; está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes gram positivos y gram negativos susceptibles a la cefalexina. En piel se recomienda como primera elección para el tratamiento de piodermias superficiales y profundos causados en su mayoría por el *Staphylococcus intermedius*. También la cefalexina es utilizada con éxito en infecciones en tejidos blandos por ejemplo sinusitis bacteriana, infecciones del aparato respiratorio, otitis media y en infecciones por gram positivos en huesos y articulaciones. En infecciones de las vías urinarias la eficiencia es cercana al 97%.

**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** cefalexina

**Dosis:** Para tejidos blandos se recomienda una dosis de 15 mg/kg cada 12 horas, para infecciones en piel por *Staphylococcus intermedius* (piodermia) se recomiendan 30 mg/kg cada 12 ó 24 horas y para osteomielitis se recomienda la dosis más alta que es de 33 mg/kg cada 6 u 8 horas, y posteriormente se puede aplicar un esquema intermedio.

**Advertencias:** La cefalexina esta contraindicada en pacientes con antecedentes alérgicos a este grupo de antibióticos. (penicilinas - cefalosporinas). Cuando el funcionamiento renal esté en riesgo deberá de evaluarse su empleo. Se ha observado en ocasiones salivación, taquipnea y excitabilidad en perros, así como vómito y fiebre en gatos.

**60600** RILEXINE 75mg X 14 tab.

**60601** RILEXINE 300mg X 14 tab.

**60602** RILEXINE 600mg X 14 tab.



## RILEXINE 200 NP

**Indicaciones:** Para el tratamiento de mastitis (contagiosas o ambientales) durante el periodo de lactación causadas por microorganismos sensibles a la fórmula.

**Fórmula:** Cefalexina 100 mg, Neomicina 100 mg, Prednisolona 10 mg.

Vía de administración: Intramamaria.

**Dosis:** Administre el contenido de una jeringa cada 12 horas durante 2 días en vacas.

Administre la mitad de una jeringa cada 12 horas durante 1 a 2 días en cabras.

**Advertencias:** No destinar al consumo humano la leche de los animales tratados hasta 4 ordeños posteriores a la última aplicación.

Consérvese en lugar fresco y seco protegido de la luz solar directa.

**60019** RILEXINE 200 NP JERINGA



## CITIUS 5%

**Indicaciones:** Para el tratamiento de mastitis y endometritis en ganado lechero y como auxiliar en el tratamiento de pododermatitis causado por *Fusobacterium necrophorum* asociado a *Bacteroides melanogenicus*. Para el tratamiento de enfermedades respiratorias causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica* y *Haemophilus somnus*, en cerdos y bovinos de engorde. Para el tratamiento de trastornos nerviosos causados por *Streptococcus suis* tipo 2 en cerdos y como auxiliar en el tratamiento del Síndrome Diarréico Neonatal asociado con *Escherichia coli* y *Salmonella ssp.* en becerros. Vía de administración: Intramuscular o subcutánea

**Fórmula:** Cefotiofur Clorhidrato 50 mg

**Dosis:** (Cefotiofur 1-3 mg/kg.) Cerdos: Aplicar 1-3 ml por cada 50 kg. de peso cada 24 horas durante 3 días por vía intramuscular.

Bovinos: Aplicar 1-3 ml por cada 50 kg. de peso cada 24 horas durante 3-5 días por vía intramuscular o subcutánea.

**60004** CITIUS 5% 100 ml

**60005** CITIUS 5% 250 ml



## FORTIUS L.A.

**Indicaciones:** puede ser usado en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. Está indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por bacterias como; *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus* y *Actinobacillus pleuropneumoniae*. Infecciones gastrointestinales y síndrome diarreico causado por *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Enterococcus spp.* Infecciones genitourinarias causadas por enterobacterias y bacterias piógenas. Algunos casos de mastitis causadas por estreptococos, estafilococos y enterobacterias, además de otras infecciones causadas por microorganismos sensibles a la Enrofloxacin.

**Vía de administración:** Intramuscular o subcutánea

**Fórmula:** Enrofloxacin 100 mg.

**Dosis:** de 1 a 3 ml por cada 40 kg de peso (equivalente a 2.5 a 7.5 mg/kg de peso), como dosis única y repetir a las 72 horas solo si es necesario.

La duración del tratamiento será a criterio del Médico Veterinario.

**Advertencias:** No inyectar más de 15 ml por sitio de aplicación.

**60010** FORTIUS 100 ml



# VIRBAC

## Reconstituyentes Vitamínicos Mineralizantes



### NUTRI-PLUS GEL

**Indicaciones:** Estimulante del apetito y suplemento concentrado de energía, vitaminas y minerales útil en pacientes con enfermedades infecciosas o inflamatorias, en convalecencia postoperatoria (incluyendo cirugía gastrointestinal), anorexia, enfermedad renal (bien tolerado en estados urémicos), estados carenciales, cachorros en crecimiento (normal o atrasado), parasitosis, periodos de gestación, post parto y lactación, estrés por reproducción, esfuerzo, exposiciones o confinamiento. También se recomienda antes y durante los calendarios de vacunación y en animales viejos. Evita la acidosis metabólica en pacientes con anorexia prolongada.

**Vía de administración:** vía oral o sobre el alimento

**Fórmula:** Vitamina A 17,635 UI, Vitamina D3 882 UI, Vitamina E 106 UI, Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Piridoxina HCl (B6), Cianocobalamina (B12), Nicotinamida, Pantotenato cálcico, Acido fólico, Sulfato de magnesio, Sulfato de manganeso, Yoduro de potasio, Hierro

**Dosis:** Administre de dos a cuatro cucharadas de 5 ml por cada 5 kilos de peso al día.

60955 Nutri-plus Gel 120gr



### SELENIE

**Indicaciones:** Reconstituyente y estimulante de la función reproductiva. Para la prevención y tratamiento del síndrome de deficiencia de Selenio y Vitamina E y para mejorar la ganancia de peso en becerros recién destetados. Para prevención de la enfermedad del músculo blanco y retención placentaria en ganado lechero. Para estimular las funciones reproductivas en ganado bovino y cerdos.

**Vía de administración:** Intramuscular ó subcutánea.

**Fórmula:** Selenito de Sodio 10.95 mg (equivalente a 5 mg de Selenio). Vitamina E 68 UI (equivalente a 50 mg de tocoferol)

**Dosis:** Vacas Adultas: 1ml/45-90 kg, 3 meses antes del parto; Terneros: 1-2 ml/90 kg.; Sementales: 1 ml/100 kg; Cerdas adultas: 1 ml/100 kg, 3 semanas antes del parto.

El tratamiento puede repetirse a los 4 meses.

**Advertencias:** El Selenio puede causar cuadros tóxicos cuando se aplica simultáneamente con dietas altas en este elemento.

60023 Selenie 100 ml

60024 Selenie 250 ml



VIRBAC  
Reconstituyentes Vitamínicos  
Mineralizantes

Comprometidos con el bienestar de sus animales

## ZOLETIL

**Indicaciones:** Zoletil es la combinación de un agente anestésico disociativo, clorhidrato de Tiletamina y un tranquilizante del grupo de las benzodiazepinas, clorhidrato de Zolazepam. Se puede utilizar como agente inductor, sedante y anestésico. Mejora el grado de tranquilidad e inconsciencia y promueve una recuperación más suave. A dosis bajas se utiliza como inductor de anestesia inhalada y como sedante para facilitar el manejo de pacientes agresivos y nerviosos, así como manipulaciones dolorosas como tomas radiológicas o curaciones de heridas. A las dosis específicas se recomienda como anestésico general para perros y gatos, fauna silvestre, animales domésticos y de laboratorio.

**Vía de administración:** intramuscular o endovenosa.

**Fórmula:** Tiletamina base (como clorhidrato), Zolazepam base (como clorhidrato)

**Dosis:**

| Vía intramuscular: | ZOLETIL 50®      | mg /Kg          |
|--------------------|------------------|-----------------|
| <b>Perros</b>      | 0.15 - 0.5 ml/kg | 7.5 a 25 mg /kg |
| <b>Gatos</b>       | 0.2 - 0.3 ml/kg  | 10 a 15 mg /kg  |
| Vía endovenosa:    | ZOLETIL 50®      | mg /Kg          |
| <b>Perros</b>      | 0.1 - 0.2 ml/kg  | 5 a 10 mg /kg   |
| <b>Gatos</b>       | 0.1 - 0.15 ml/kg | 5 a 7.5 mg /kg  |

60815 ZOLETIL 5ml



## ZOLETIL 100

**Dosis:**

| Vía intramuscular: | ZOLETIL 100®       | mg /Kg         |
|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Perros</b>      | 0.075 - 0.25 ml/kg | 7.5 a 25 mg/kg |
| <b>Gatos</b>       | 0.1 - 0.15 ml/kg   | 10 a 15 mg/kg  |
| <b>Cerdos</b>      | 0.4 - 0.7 ml/10 kg | 4 - 7 mg/kg    |
| <b>Becerras</b>    | 0.3 - 0.4 ml/10 kg | 3 - 4 mg/kg    |

| Vía endovenosa: | ZOLETIL 100®       | mg /Kg         |
|-----------------|--------------------|----------------|
| <b>Perros</b>   | 0.05 - 0.1 ml/kg   | 5 a 10 mg/kg   |
| <b>Gatos</b>    | 0.05 - 0.075 ml/kg | 5 a 7.5 mg /kg |
| <b>Cerdos</b>   | 0.1 - 0.2 ml/10kg  | 1 - 2 mg/kg    |
| <b>Becerras</b> | 0.1 mg/10 kg       | 1 mg/kg        |

60830 100



## AQUADENT

**Indicaciones:** Es una solución refrescante y palatable que debe ser adicionada al agua de bebida de los perros y gatos, para el control del mal aliento.

Aquadent fue desarrollado para facilitar la higiene oral de los animales y debe ser parte de un programa completo de higiene y salud odontológica, el cepillo de dientes, el uso de chews y la evaluación odontológica periódica por el médico veterinario.

**Vía de administración:** vía oral. Diluido en el agua de bebida.

**Fórmula:** Cada 100ml contienen: Xylitol 051g, vehículo c.b.p 100.0 ml.

**Dosis:** Diluya 5ml de Aquadent en cada 500ml utilizando el vaso dosificador.

Consumo diario de 10ml/1 Litro de agua a libre acceso. Cambiar la solución cada 24 horas aunque no haya sido totalmente consumida.

60980 AQUADENT



## VEGGIEDENT FRESH

**Indicaciones:** Las tiras masticables, que dan aliento fresco y saludable a los perros.

**Su tecnología FR3SH funciona de 3 maneras:**

**Granada:** limita el crecimiento bacteriano, por ende limita la formación de gases volátiles que generan el mal aliento. Mejorando el aliento a nivel oral.

**Eritritol:** Refresca el aliento y limita la formación de bacterias. Mejorando el aliento a nivel oral.

**Inulina:** Es un prebiótico que equilibra la microflora gastrointestinal, limitando la formación de gases mal olientes. Mejorando el mal aliento de origen digestivo.

**Su forma patentada en "Z":** mejora la masticación y favorece la acción mecánica del raspado de sarro dental alrededor de los dientes y de las encías.

Es a base de plantas naturales, bajo en calorías, hipoalergénico con un sabor delicioso para los perros.

Galardonado por la VOHC ya que previene la enfermedad periodontal, limitando la formación de cálculo dental, placa bacteriana y la gingivitis.

60985 VEGGIEDENT FR3SH S

60986 VEGGIEDENT FR3SH L



## ALLERMYL GLYCO

Es el shampoo para la higiene regular de los perros y gatos.  
Es ideal para los baños de animales alérgicos o con piel sensible.

**INDICACIONES:**

Auxiliar en el mantenimiento de la integridad de la barrera cutánea.  
Refuerza el equilibrio de la piel. Da brillo natural al pelaje.

**PROPIEDADES:**

Las ceramidas y ácidos grasos esenciales refuerzan la integridad de la barrera cutánea y mantiene la hidratación de la piel.

**Glicotecnología:** Tiene monosacáridos y polisacáridos que brindan un efecto antiadherente de los agentes alérgicos.

Posee un pH neutro respetando el pH fisiológico de la piel.

Uso frecuente: tiene agentes de limpieza que permiten una limpieza suave.

**60710** ALLERMYL GLYCO



## HEXADENE SPHERULITES

**INDICACIONES:** Es un champú medicado a base de Clorhexidina al 3 % y Spherulites® que es un sistema de encapsulamiento de liberación lenta de la Clorhexidina. Está indicado en perros y gatos para el tratamiento de infecciones de la piel causadas por bacterias y hongos.

**DOSIS Y MODO DE USO:** Uso Tópico, agite antes de usar, aplique sobre el pelo mojado una cantidad suficiente para crear abundante espuma con un masaje vigoroso sobre todo el cuerpo del animal, espere 10 a 15 minutos para enjuagar con agua limpia.

Repetir el tratamiento 2 ó 3 veces por semana hasta la remisión de los síntomas o a criterio del médico Veterinario.

**PRESENTACIÓN:**

Envase plástico de 250 ml con tapa Flip Top y sello interno de seguridad.

**60711** HEXADENE 250 mL



## EPI-SOOTHE

**INDICACIONES:** Es un champú medicado a base de Glicerina y Avena coloidal para pieles sensibles que tienden a irritarse con el uso de champús comunes o como coadyuvante de tratamientos antialérgicos. EPI SOOTHE calma la picazón producida por procesos alérgicos. Su uso frecuente no altera la integridad del pelo y lo mantiene suave y brillante.

**DOSIS Y MODO DE USO:** Uso Tópico, agite antes de usar, aplique sobre el pelo mojado una cantidad suficiente para crear abundante espuma con un masaje vigoroso sobre todo el cuerpo del animal, espere 10 a 15 minutos para enjuagar con agua limpia.

**PRESENTACIÓN:** Envase plástico de 250 ml con tapa Flip Top y sello interno de seguridad.

60712 EPISOOTHE 250 mL



## KETOCHLOR

**INDICACIONES:** KETOCHLOR® es un champú terapéutico, antiséptico y limpiador cuya formulación auxilia en el tratamiento y/o control de infecciones de la piel causadas por bacterias y/u hongos que responden al Ketoconazol y a la Clorhexidina en perros y gatos. Ambos ingredientes poseen un amplio espectro de acción, actuando de manera eficaz en pioderma superficial tal como foliculitis bacteriana, y dermatitis por Malassezia.

Mantiene la piel saludable con la Tecnología S-I-S SKIN INNOVATIVE SCIENCE™. Provee efecto antiadhesivo contra microorganismos (Glicotecnología) y promueve las defensas microbianas naturales de la piel (Tecnología Defensinas).

**Presentación:** Frascos de 250 ml

**Vía de administración:** Tópica

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene 1 g de Ketoconazol y 2.3 ml de Clorhexidina gluconato

**Dosis:** Agite el producto antes de usar. Aplique KETOCHLOR® sobre el pelaje previamente mojado, dando masaje vigoroso en todo el cuerpo del animal hasta formar abundante espuma, espere de 10 a 15 minutos antes de enjuagar con abundante agua y repita la operación. Se recomienda aplicar de 2 a 3 veces por semana, dependiendo de la severidad de la infección, hasta la mejoría de los signos, posteriormente puede ser usado una vez por semana. Establezca un protocolo de acuerdo con el estado del paciente. A recomendación del Médico Veterinario.

60715 KETOCHLOR 250 mL



## SEBOLYTIC

**INDICACIONES:** es un champú terapéutico, cuya formulación auxilia en el tratamiento y control de las dermatitis seborreicas (desqueratonizaciones, usos o trastornos queratoseborreicos mixtos) en perros, favoreciendo la restauración de la integridad del pelo y promoviendo el mantenimiento del equilibrio natural. Contiene gluconato de zinc, clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6) y aceite de melaleuca que mejoran la exfoliación de la piel y promueven la reducción de la grasa, ya que poseen propiedades antiséborreicas. El ingrediente activo Piroctona Olamina actúa contra hongos y bacterias, controlando la proliferación y reducción de la carga microbiana de la piel, factor que complica las dermatitis seborreicas. Complementariamente, la presencia de los monosacáridos D Galactosa, L-Ramnosa y D-Manosa y los extractos vegetales de las especies Filipendula ulmaria (ulmaria) y Peumus boldus (boldo) actúan en las capas externas e internas de la piel, favoreciendo el equilibrio de sus defensas naturales.

**Presentación:** Frascos de 250 ml

**Vía de administración:** Tópica

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene 500 mg de Piroctona olamina y 100 ml de vehículos.

**Dosis:** Aplicar después de mojar el pelo limpio del animal con agua, aplicar el shampoo dermatológico SEBOLYTIC esparciéndolo por todo el cuerpo en una cantidad suficiente para que se pueda enjabonar toda la superficie del animal. Masajear uniformemente hasta formar espuma, dejando que el producto permanezca en el pelo durante 10 minutos. Enjuagar enseguida. Repetir el procedimiento. Aplicar una o dos veces por semana. Hasta la mejora del cuadro dermatológico, siguiendo siempre las recomendaciones del Médico Veterinario.

60716 SEBOLYTIC250 mL



## MEGADERM

**INDICACIONES:** es un suplemento nutricional que contiene ácidos grasos esenciales Omega 3 y Omega 6, en cantidades y relación óptimas de 5:1, al cual se le ha adicionado Vitamina E. Está indicado como coadyuvante en el tratamiento de la piel y pérdida excesiva del pelo. Ayudan a regular la integridad de la piel y contribuyen a reducir enrojecimiento y comezón.

**COMPOSICION:** Cada sobre de 4 mL contiene  
 Vitamina E 3 a 700.....16.92 mg  
 Ácidos grasos Omega 6.....1888 mg  
 Ácidos grasos Omega 3.....400 mg  
 Vehículo CSP..... 4 mL.

**DOSIS:** 1 sobre por día, hasta la restauración de la integridad de la piel. Repetir conforme a la recomendación del Médico Veterinario.  
 1 sobre cada dos días para el cuidado de la piel y el pelo del animal. Repetir conforme a la recomendación del Médico Veterinario.

**PRESENTACION:** Caja con 28 sobres de 4 mL.

**60900** MEGADERM 10Kg



## EPI-OTIC SIS

\*Tecnología SIS: presencia de la Glicotecnología (monosacáridos) que evitan la adherencia de alérgenos, bacterias y levaduras; y extractos de vegetales que actúan en las capas externas e internas de la piel, favoreciendo el equilibrio de sus defensas naturales.

**Indicaciones:** Solución ótica para la higiene del conducto auditivo y pretratamiento de las otitis externas de perros y gatos.

**Vía de administración:** Ótica.

**Fórmula:** Acido Salicílico

**Dosis:** Previo al tratamiento de otitis externa aplicar EpiOtic abundantemente hasta llenar el canal auditivo, cada 12 horas durante 3-5 días. Limpiar el exceso de fluido con algodón. Para higiene regular: 3-5 gotas en cada oído.

\*Aplicar el EpiOtic 5 días previos a iniciar con el tratamiento de Easotic, durante los 5 días de aplicación del Easotic y 10 días después de este tratamiento no limpiar los oídos.

**60958** EPIOTIC SIS 100ml



## EASOTIC

Tratamiento para otitis externa asociada con bacterias, levaduras y hongos

### FÓRMULA

Hidrocortisona aceponato 1.11 mg  
Miconazol (nitrato) 15.1 ml  
Gentamicina (sulfato)  
Excipiente c.b.p/ c.s.p  
1505 UI  
1 ml

### USO VETERINARIO

Para el tratamiento de la otitis externa asociada con bacterias sensibles a la gentamicina, hongos y levaduras sensibles al miconazol.

### BENEFICIOS

- \*Rápido alivio del prurito, la inflamación y el dolor.
- \*Amplio espectro de acción: para el tratamiento de las otitis externas más comunes.
- \*Su composición asegura una excelente adherencia al oído: siendo muy eficaz en su acción
- \*El tratamiento más rápido y fácil de aplicar en casa para resolver la otitis dolorosa.
- \*Boquilla flexible atraumática y delicada.
- \*Dosificación controlada con un solo disparo, precisión y entrega desde cualquier ángulo.
- \*Una mejor experiencia para los dueños de mascotas, sin generar dolor al aplicarlo.

### INDICACIONES

Para el tratamiento de la otitis externa asociada con bacterias sensibles a la gentamicina:

- Staphylococcus intermedius
- Streptococcus spp
- Pseudomona aeruginosa
- Proteus mirabilis
- Escherichia coli

Hongos / levaduras sensibles al miconazol principalmente:

- Malassezia pachydermatis.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar por vía auricular.

### DOSIS

Administrar 1 ml de Easotic® (un disparo), por oído. Repetir el tratamiento una vez al día por 5 días consecutivos.

### MODO DE USO

1. Agitar antes de usarse.
2. Introducir la cánula atraumática en el canal del oído.
3. Administrar una dosis de 1 ml del producto en cada oído afectado.
4. Esta dosis es liberada adecuadamente por la activación del dosificador.

\*\*Es recomendable hacer una limpieza con Epi-Otic, 2 horas previas de aplicar el Easoic.\*\*

PRESENTACIÓN: Frasco de 10 ml, con bomba y cánula flexible

### RECOMENDACIONES

Su venta requiere receta médica. Agitar antes de usarse.

60956 EASOTIC



## MEGLUDYNE

**Indicaciones:** Como coadyuvante en el tratamiento de mastitis, neumonía y diarrea en bovinos. Para el control del dolor visceral en casos de cólico en equinos y para el tratamiento de procesos inflamatorios asociados con alteraciones músculo-esqueléticas en bovinos, equinos, porcinos y caninos.

**Via de administración:** Intramuscular o intravenosa.

**Fórmula:** Flunixin meglumina 83.0 mg (equivalente a 50 mg de Flunixin base)

**Dosis:** Bovinos: 1-2 ml por cada 45 kg vía I.M. o I.V., cada 24 horas durante 3-5 días. Equinos: 1-2 ml por cada 45 kg vía I.M. o I.V., cada 24 horas durante 2 días. Porcinos: 1-2 ml por cada 45 kg vía I.M. o I.V., cada 24 horas durante 3-5 días.

**Advertencias:** No administrar en animales de menos de 3 días de edad. No consumir la carne de animales tratados hasta después de 24 horas en bovinos y después de 21 días en porcinos. No consumir la leche de animales tratados hasta 12 horas después de la última aplicación. No administrar a caballos con historial de hipersensibilidad al flunixin. Evitar la inyección intraarterial en equinos, ya que se pueden presentar reacciones adversas tales como: incoordinación, hiperventilación, histeria y debilidad muscular. Estos signos son pasajeros y desaparecen sin la necesidad de tratamiento.



**60011** MEGLUDYNE 100 ml

## CORTAVANCE

**Indicaciones:** Dermoesteroide para el tratamiento sintomático de las dermatosis pruríticas e inflamatorias del perro.

**Via de administración:** cutáneo

**Fórmula:** Hidrocortisona Aceponato.

**Dosis:** se aplica presionando el atomizador a una distancia de unos 10 cm de la zona a tratar. La dosis recomendada es de 1,52 µg de hidrocortisona aceponato/cm<sup>2</sup> de piel afectada al día. Esta dosis puede obtenerse con dos aplicaciones del atomizador sobre la superficie a tratar equivalente a un cuadrado de 10 cm x 10 cm. Repetir el tratamiento diariamente durante 7 días consecutivos. La superficie corporal total tratada no debe exceder de un área correspondiente, p.e., a un tratamiento de los dos costados, desde el lomo hasta las cadenas mamarias incluidos los hombros y los muslos.

**Advertencias:** No asperjar en los ojos del animal. Presentado como un spray volátil, este medicamento no requiere masaje. En el caso de enfermedad microbiana concurrente o de infestación parasitaria, el perro deberá recibir el tratamiento apropiado. El uso en gestantes, lactantes, menores de 7 meses y animales con el Síndrome de Cushing debe basarse en la evaluación del riesgo contra el beneficio.

**60800** CORTAVANCE frasco 76ml



# VIRBAC

## Antiinflamatorios

### CYCLAVANCE

**INDICACIONES:** Cyclavance está indicado en el tratamiento de las manifestaciones clínicas de dermatitis atópica en perros (DAP) Esta enfermedad alérgica de la piel, es causada por alérgenos tales como ácaros del polvo, polen, etc. que estimulan una respuesta inmunitaria excesiva. La ciclosporina reduce la inflamación y la picazón asociada con la dermatitis atópica de perro.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral

**DOSIS:** Administrar 0.05 ml de Cyclavance® por cada kg de peso ( 0.5 mL por cada 10 Kg de peso (equivalente a 5 mg de ciclosporina/kg) 2 horas antes o después de la comida, diariamente hasta la mejoría de los signos.

**FÓRMULA:**

Cada 1 mL contiene:

Ciclosporina..... 100 mg.

Vehículo..... CS

**Presentación:** Frasco de 15 mL y 50 mL.

60021 CYLAVANCE 15 mL

60022 CYLAVANCE 50 mL



## CANIGEN MHA2 PUPPY

**Indicaciones:** vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, Adenovirus tipo 2 y Parvovirus.

**Vía de administración:** subcutánea o intramuscular.

**Fórmula:** Moquillo canino cepa Lederle 103-5 DICT50; Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan 104-6 DICT50; Parvovirus canino atenuado cepa Cornell 105-7 DICT50.

**Dosis:** frasco unidosis de 1ml. Como primera vacunación aplique una dosis entre las 6 u 8 semanas de edad, seguida de revacunaciones cada 2 ó 3 semanas, a criterio del Médico Veterinario.

**60805** VACUNA CANIGEN MHA2L PUPPY caja 10 dosis



## CANIGEN MHA2 PPI/L QUÍNTUPLE

**Indicaciones:** vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, Parvovirus, Leptospirosis canina y Complejo Respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza.

**Vía de administración:** Subcutánea o intramuscular.

**Fórmula:** Moquillo canino cepa Lederle 103-5 DICT50; Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan 104-6 DICT50; Parvovirus canino atenuado cepa Cornell 105-7 DICT50; Parainfluenza canina atenuada cepa Manhattan 105-7 DICT50; Leptospira interrogans canicola inactivada 800 x 106 /ml; Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae inactivada 800 x 106 /ml

**Dosis:** frasco unidosis de 1ml. Como primera vacunación aplique una dosis entre las 8 ó 9 semanas de edad, seguida de revacunaciones cada 2 ó 3 semanas, a criterio del Médico Veterinario. Refuerzo anual.

**60803** VACUNA CANIGEN QUINTUPLE caja 10 dosis



## CANIGEN MHA2PPf/LR (Séxtuple)

**Indicaciones:** Para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis infecciosa, complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza canina, Parvovirus canino, Leptospirosis y Rabia canina.

**Vía de administración:** Subcutánea.

**Fórmula:** La fracción liofilizada contiene virus atenuados de:

Virus Distemper canino (cepa Lederle) .....103 - 105 DICC50  
Adenovirus canino tipo 2 (cepa Manhattan) .... 104 - 106 DICC50  
Parvovirus canino (cepa CPV 780916) .....105 - 107 DICC50  
Parainfluenza canina (cepa Manhattan) .....105 - 107 DICC50  
Excipiente c.b.p. ....1 dosis

La fracción líquida contiene Leptospira interrogans inactivadas:

Leptospira canicola no menos de .....8.33 x 10<sup>8</sup> bacterias  
Leptospira icterohaemorrhagiae no menos de ... 8.33 x 10<sup>8</sup> bacterias  
Virus Rábico inactivado (cepa VP12) ..... mínimo 1 U.I.  
Vehículo c.b.p. .... 1 ml

**Dosis:** Administrar 1 dosis de 1 ml.

60806 CANIGEN MHA2PPI/LR (Séxtuple)



## LEUCOGEN

**Indicaciones:** vacuna para la inmunización activa contra el retrovirus causante de la Leucemia Viral Felina.

**Vía de administración:** Subcutánea o intramuscular.

**Fórmula:** P45 102 µg

**Dosis:** frasco unidosis de 1 ml. En términos generales la primera vacuna se recomienda a partir de la de la 9ª semana de edad y la revacunación cada 3 semanas a criterio del Médico Veterinario. Revacunación anual. El número de revacunaciones dependerá de la zona, la raza, la edad, estado general de la mascota y riesgo potencial.

**60850** VACUNA LEUCOGEN  
caja 10 dosis



## RABIGEN L

**Indicaciones:** vacuna inactiva líquida para la inmunización contra la rabia. En cachorros deben de considerarse factores como edad, riesgo de exposición, estado nutricional e inmunidad materna entre otros. Considere la revacunación según la Norma Oficial Mexicana

**Vía de administración:** subcutánea o intramuscular.

**Fórmula:** Virus rábico inactivado Cepa Pasteur VP12 2 U.I.

**Dosis:** frasco unidosis de 1 ml

**60802** VACUNA RABIGEN caja 10 dosis



## FELIGEN CRP

**Indicaciones:** vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización activa de la Panleucopenia Viral Felina, así como para prevenir el complejo respiratorio felino producido por Calicivirus y Rinotraqueitis.

**Vía de administración:** Subcutánea o intramuscular.

**Fórmula:** Virus atenuado de Calicivirus felino, cepa F9 105-7 DICT50; Virus de la Rinotraqueitis felina, cepa F2 105-7 DICT50; Virus de la Panleucopenia felina, cepa LR72 103.7-5.7 DICT50

**Dosis:** frasco unidosis de 1ml. En términos generales la primera vacuna se recomienda a partir de la de la 9ª semana de edad y la revacunación cada 3 semanas a criterio del Médico Veterinario. Revacunación anual. • El número de revacunaciones dependerá de la zona, la raza, la edad, el estado general de la mascota y el riesgo potencial.

**60808** VACUNA FELIGEN CRP caja 10 dosis



## FELIGEN CRP/R + RABIA

**Indicaciones:** Para la inmunización activa de gatos contra Calivirus Felino, Rinotraqueitis Viral felina, Panleucopenia Felina y Rabia.

**Vía de administración:** Subcutánea.

**Fórmula:** Calicivirus felino (cepa F9), Virus de Rinotraqueitis felina (cepa F2), Virus de Panleucopenia Felina (cepa LR72).

**Dosis:** Administrar una dosis de 1 ml.

En términos generales la primera vacuna se recomienda a partir de la de la 12ª semana de edad como revacunación, 3 o 4 semanas después de vacunar con **Feligen® CRP/R**, a criterio del Médico Veterinario.

**Revacunación anual.**

El número de revacunaciones dependerá de la zona, la raza, la edad, el estado general de la mascota y el riesgo potencial.

**60809** VACUNA FELIGEN CRP/R + RABIA



## CLOSTRISAN 9+T

**Indicaciones:** Vacuna inactivada que consta de 10 antígenos para la prevención de: pierna negra, gangrena gaseosa, edema maligno, enterotoxemias debidas a clostridios, hemoglobinuria bacilar, tétano y demás enfermedades clostridiales causantes de muerte súbita.

**Vía de administración:** Aplicar por vía subcutánea. Agitar enérgicamente antes y durante su uso.

**Fórmula:** Cada dosis contiene antígenos inactivados de: Clostridium chauvoei Clostridium novyi tipo B, Clostridium perfringens tipo A, Clostridium perfringens tipo B, C y D, Clostridium septicum, Clostridium haemolyticum, Clostridium sordellii, Clostridium tetani, Excipientes c.s.p. 5 mL (dosis bovina), Hidróxido de aluminio como adyuvante y Timerosal como conservante.

**Dosis:** Bovinos: 5 ml Ovinos y caprinos: 2 ml.

**60055** CLOSTRISAN 9+T 100ml

**60056** CLOSTRISAN 9+T 250ml





DISTRIBUYE:



Comprometidos con el bienestar de sus animales

# CALOX

## Desparasitantes internos y externos

### IVERMECTINA 1%

**Indicaciones:** Antiparasitario interno y externo de amplio espectro que actúa sobre nematodos gastrointestinales y pulmonares (adultos y cuarta fase larvaria), piojos, ácaros, larvas de mosca y garrapatas en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

**Vía de administración:** subcutánea exclusivamente.

**Fórmula:** Ivermectina 1%

**Dosis:** Bovinos, caprinos y ovinos 1ml cada 50kg de peso vivo. Porcinos 1ml cada 33kg de peso vivo.

**70203** IVERMECTINA 1 % 20ml

**70204** IVERMECTINA 1 % 60ml

**70210** IVERMECTINA 1 % 100ml

**70206** IVERMECTINA 1 % 240ml

**70101** IVERMECTINA 1 % 600ml



### IVERMECTINA 3.15%

**Indicaciones:** Antiparasitario interno y externo de amplio espectro que actúa por más tiempo sobre nematodos gastrointestinales y pulmonares (adultos y cuarta fase larvaria), piojos, ácaros, larvas de mosca y garrapatas en bovinos.

**Vía de administración:** subcutánea exclusivamente.

**Fórmula:** Ivermectina 3,15%

**Dosis:** Bovinos 1ml cada 50kg de peso vivo.

**70887** IVERMECTINA 3.15% 60ml

**70889** IVERMECTINA 3.15% 100ml

**70888** IVERMECTINA 3.15% 240ml

**70890** IVERMECTINA 3.15% 500ml



### IVERMECTINA L.A.

**Indicaciones:** Antiparasitario interno y externo de amplio espectro que actúa sobre nematodos gastrointestinales y pulmonares (adultos y cuarta fase larvaria), piojos, ácaros, larvas de mosca y garrapatas en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

**Vía de administración:** intramuscular o subcutánea.

**Fórmula:** Ivermectina 1% de larga acción.

**Dosis:** Bovinos, caprinos y ovinos 1ml cada 50kg de peso vivo. Porcinos 1ml cada 33kg de peso vivo.

**70304** IVERMECTINA LA 60ml

**70302** IVERMECTINA LA 100ml

**70303** IVERMECTINA LA 240ml

**70300** IVERMECTINA LA 600ml



## PRAMECTINA EQUINA

**Indicaciones:** Para el control y tratamiento de parasitosis gastrointestinales y pulmonares, Oxiuris equi, Parascaris equorum, Strongylus sp., Strongyloides sp., Trichostrongylus sp., Habronema sp., Tenias sp., Anaplocephala sp., así como también ectoparásitos: garrapatas, sarna y piojos. Una sola dosis es suficiente para ejercer su efecto ovicida, larvicida y adulticida. Efecto residual (hasta un mes de protección).

**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** Ivermectina + Prazicuantel

**Dosis:** 1cc por cada 50 kg de peso o una jeringa para 600 kg.

**70846** PRAMECTINA EQUINA 12g



## IVERMECTINA GEL EQUINOS palatable sabor a manzana verde

**Indicaciones:** para parasitosis gastrointestinales, pulmonares y cutáneas de los equinos. Es altamente efectivo contra el gusano del cuajo.

**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** Ivermectina

**Dosis:** 12 grs de la jeringa es suficiente para el tratamiento de un equino adulto de hasta 600 kg a la dosis recomendada de 200 ug de ivermectina por Kg de peso vivo (1 cc por cada 50kg de peso). Para animales de peso menor se debe correr la rueda en la escala graduada hasta la marca correspondiente al peso del animal, luego destapa la cánula y depositar el producto en la boca dejando que el animal degluta normalmente.

**70205** IVERMECTINA GEL EQUINOS 12GRS



## PRAMECTINA MASCOTAS

**Indicaciones:** Control y tratamiento de parasitosis gastrointestinales y pulmonares: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Strongyloides stercoralis, Trichuris vulpis, Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, tenias spp., así como también ectoparásitos: garrapatas, sarna (Demodex canis, Demodex cati, Sarcoptes scabiei, Otodectes cynotis, Notoedres cati), control de piojos y pulgas, como preventivo de filariasis (Dirofilaria immitis) en perros.

**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** Ivermectina + Prazicuantel

**Dosis:** 1 tableta por cada 10 kg. En caso de tenias repetir a los 21 días.

**Preventivo de filarias:** 1/4 de tableta / 10 kg cada 30 días.

**70845** PRAMECTINA 4 TABLETAS



## CALOX Desparasitantes internos

### IVERMECTINA MASCOTAS

**Indicaciones:** Tratamiento y prevención de parasitosis, internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares) y externas (piojos, ácaros, larvas de mosca y garrapatas); como preventivo en filariasis.


**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** Ivermectina

**Dosis:** Caninos 1 tableta cada 30kg de peso. Felinos 1 tableta cada 15kg.

**70011** IVERMECTINA 6mg X 24 tab.

**70013** IVERMECTINA 6mg X 100 tab.



### PRAMECTINA AVES

**INDICACIONES:** Tratamiento y control de parásitos internos y externos de las aves. La combinación de antiparasitarios en la fórmula, permite que Pramectina sea un producto de amplio espectro, eficaz contra Nematodos gastrointestinales, Tenias, Tremátodos, piojos chupadores, ácaros hematófagos y de la sarna.

**COMPOSICIÓN:** cada tableta contiene:

Ivermectina ..... 1 mg

Prazicuantel.....25 mg

Fenbendazol..... 40 mg

**ADMINISTRACION Y DOSIS:** Aves de compañía: administrar una tableta por cada 2.5 Kg de peso como dosis única o a criterio del Médico Veterinario. • En infestaciones altas, repetir a los 14 ó 20 días. • En infestaciones por Capilaria y Tremátodos dar tres días seguidos. • En el control de parásitos externos, repetir el tratamiento cada 7 días por no más de 4 ocasiones.

**PRESENTACIÓN:** Caja de 100 tabletas (10 blisters de 10 tabletas cada uno )

**70705** PRAMECTINA 100 TABLETAS



### PIRANTEL SUSPENSIÓN

**Indicaciones:** Tratamiento y prevención de las parasitosis gastrointestinales más caninos y felinos, sean estas aisladas o asociadas, causadas por Strongyloides Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Toxascaris leonina, Toxocara canis, Toxocara caninos y felinos y vermes gástricos (Physaloptera sp) en felinos. Puede ser utilizado durante la preñez. Máxima efectividad en parásitos de cachorros.

**Vía de administración:** oral

**Fórmula:** Pamoato de Pirantel.

**Dosis:** 1 ml / 5 kg de peso en caninos y 1 ml / 2,5 kg de peso en felinos.

**70307** PIRANTEL SUSPENSIÓN 15 ml.



## CENIT TABLETAS

Asociación de antihelmínticos que garantizan la remoción total de endoparásitos en caninos y felinos ejerciendo un efecto ovicida, larvicida y adulticida haciéndolo altamente eficaz tanto en nemátodos como cestodes.

**Composición:** Fenbantel: 150 mg. Pamoato de pirantel 144 mg. Prazicuantel 50 mg.

**Indicaciones:** Antiparasitario de amplio espectro para el control y tratamiento de parásitos planos y redondos en caninos. Es efectivo contra *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Uncinaria stenocephala*, *Dipylidium canino*, *Taenia spp* y *Oxiuris sp*. La combinación de estos 3 activos le confiere un amplio espectro de acción contra todo tipo de parásitos comunes en caninos y felinos.

**Dosis:** 1 tableta por cada 10 kg de peso vivo. Dosis única. Animales con peso superior a 40 kg con 4 tabletas es suficiente. En infestaciones severas por tenias repetir a los 20 días.

**Vía de Administración:** Oral.

**70498** CENIT TABLETAS DISP 40 tabl.



## ALBENDAZOL PRAZICUANTEL

**Indicaciones:** Para el control y tratamiento del parasitismo gastrointestinal en perros y gatos producido por: *Ancylostoma caninum*, *Dipylidium aninum*, *Taenia taeniformis*, *Taenia pisiformis*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocuris*, *Wxyuris sp.*, *Toxocara canis*, *Toxascaris sp.*, *Uncinaria sp.*

**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** Albendazol + Prazicuantel

**Dosis:** 1ml por cada 5kg de peso.

**70106** ALBEN. + PRAZ. 5 ml.

**70107** ALBEN.+ PRAZ. 10 ml.



## ALBENDAZOL 10% y 20%

**Indicaciones:** Para el control y tratamiento de parasitosis gastrointestinales, pulmonares y hepáticas con eliminación de huevos, larvas y adultos de helmintos con una sola aplicación

**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** Albendazol.

**Dosis:** 5 - 10 mg por kg de peso en Bovinos.

**70095** ALBENDAZOL 10% 250ml

**70100** ALBENDAZOL 10% litro

**70098** ALBENDAZOL 20% 100ml

**70096** ALBENDAZOL 20% 250ml

**70094** ALBENDAZOL 20% litro

**70097** ALBENDAZOL 20% 1,800ml



# CALOX

## Desparasitantes externos

### PULGAKILL TABLETAS

PRODUCTO  
NUEVO

**Indicaciones:** Antiparasitario, pulguicida para perros y gatos. Pulgas del perro: *Ctenocephalides canis*. Pulgas del gato: *Ctenocephalides felis*. Efecto residual hasta 4 semanas tras una única administración del medicamento. Puede utilizarse para el control de la dermatitis alérgica por pulga.

**Presentación:** cajas de cartón de 1 tableta masticable, 2 tabletas masticables, 3 tabletas masticables y 4 tabletas masticables.

**Vía de administración:** Oral.

**Fórmula:** Cada tableta contiene Spinosad 495 mg, excipientes c.s.p

**Dosis:** Caninos y felinos: Suministrar una tableta por cada 10 Kg de peso vivo de ser necesario repetir a los 30 días o según recomendación del Médico Veterinario.

70058 PULGAKILL TABLETAS XL (4 TAB)

70057 PULGA KILL TABLETAS L (3 TAB)



CALOX  
Desparasitantes externos

## IMIDOCARB CALOX

**Indicaciones:** Para el tratamiento y control de piroplasmosis en bovinos, equinos y caninos (*Babesia bovis*, *Babesia bigemina*, *Babesia caballi*, *Babesia equi*, *Babesia canis*). Además, para el tratamiento y control de anaplasmosis en bovinos causada por *Anaplasma marginale*. Como coadyuvante en el tratamiento de *Ehrlichia canis* en caninos.

**Presentaciones:** Frasco 10 ml, 50 ml y 100 ml.

**Administración:** Uso intramuscular y subcutáneo.

**Advertencias:**

No use este producto simultáneamente con drogas que inhiben a la colinesterasa, antihelmínticos o insecticidas organofosforados.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Utilizar bajo la supervisión del Médico Veterinario.

Una vez abierto el envase primario el periodo de validez es de 28 días.

**Periodo de retiro:**

Bovinos: Carne: 224 días. Leche: 6 días.

Equinos: no utilizar en equinos destinados a consumo humano.

**Dosificación:**

Equinos: Dosis única de 4,4 mg/kg (3,6 mL/100kg) o 2,2 mg/kg (2 mL/100kg) dividida en 2 dosis, con un intervalo de 24 a 48 horas entre dosis. Vía IM.

Bovinos: Anaplasmosis: 5 mg/kg (4,2 mL/100kg), repetir a los 7 días Piroplasmosis: 1-3 mg/kg (1-2,5 mL/100 kg). Vía SC o IM.

Caninos: 6,6 mg/kg (0,5mL/ 10 kg), repetir la dosis en 2 semanas. Vía SC o IM.

70274 IMIDOCARB FRASCO 10 ML

70275 IMIDOCARB FRASCO 50 ML

70276 IMIDOCARB FRASCO 100 ML

CALOX  
Antiprotozoario



## CALOX Antibióticos

### DOXICICLINA CON CUBIERTA ENTÉRICA

**Indicaciones:** Tratamiento de enfermedades bacterianas del tracto gastrointestinal, aparato respiratorio y genitourinario, en infecciones por Rickettsias, Chlamydias y micoplasmas. Eficaz contra bacterias anaerobias y algunas facultativas gram-, *Nocardia sp*, *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Shigella sp*, *Salmonella sp*, *Campylobacter sp*.

**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** Doxiciclina Hiclato.

**Dosis:** 5 mg/kg dosis inicial, 2,5 mg/kg cada 12 horas por 2 días y continuar el tercer día de tratamiento cada 24 horas. En problemas de Ehrlichiosis canina se recomienda 200mg diarios en dos tomas por 21 días.

**70840** DOXI 100mg blister 10 und.

**70841** DOXI 100mg caja 500 tab

**70843** DOXI 50mg caja 14 tab

**70842** DOXI 50mg caja 500 tab

**70844** DOXI 50mg blister 10 und.



PRODUCTO  
NUEVO

### DOXICICLINA SIN CUBIERTA ENTÉRICA

**Indicaciones:** Tratamiento de enfermedades bacterianas del tracto gastrointestinal, aparato respiratorio y genitourinario, en infecciones por Rickettsias, Chlamydias y micoplasmas. Eficaz contra bacterias anaerobias y algunas facultativas gram-, *Nocardia sp*, *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Shigella sp*, *Salmonella sp*, *Campylobacter sp*.

**Presentación** Estuche con 14 tabletas, estuche con 100 tabletas y dispensador con 500 tabletas, en 50 mg, 100 mg y 200 mg

**Vía de administración:** Oral

**Fórmula:** Doxiciclina Hidrato.

**Dosis:** 5 mg/kg dosis inicial. **Doxiciclina 50mg** Caninos y felinos: 1 tableta cada 10 Kg de peso vivo dos veces al día. **Doxiciclina 100mg** Caninos y felinos: 1 tableta cada 20 Kg de peso vivo dos veces al día. **Doxiciclina 200 mg** Caninos: 1 tableta cada 40 Kg de peso vivo dos veces al día.

**70861** DOXICICLINA 50 MG SIN CUBIERTA BLISTER 10 TAB

**70843** DOXICICLINA 100 MG SIN CUBIERTA BLISTER 10 TAB.

**70852** DOXICICLINA 200 MG SIN CUBIERTA BLISTER 10 TAB.

**70862** DOXICICLINA 100 MG X 500 TABLETAS SIN CUBIERTA



CALOX  
Antibióticos

# CALOX Antibióticos

## CEFALEXINA

**Indicaciones:** Cefalosporina sintética eficaz en enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes Gram (+) y Gram (-), sensibles a la cefalexina. Especifico para el tratamiento de infecciones de la piel, tejidos blandos, osteoarticulares, gastrointestinales, oído medio, vías respiratorias o genitourinarias.

**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** Cefalexina.

**Dosis:** 25-30 mg / Kg, cada 8-12 horas. por un período no menor a 7 días. En infecciones severas puede suministrarse hasta por 30 días.

**70030** CEFALEXINA 500mg 16 tabl.

**70031** CEFALEXINA 500mg 80 tabl.



## ENROFLOXACINA TABLETAS

**Indicaciones:** Indicada en el tratamiento de infecciones locales y sistémicas en caninos y felinos. Infecciones respiratorias, gastrointestinales, urinarias, de piel y mucosas, otitis crónicas, prostatitis, meningocencefalitis y artritis bacteriana. Se recomienda en casos de micobacteriosis cutáneas en gatos (2,5 mg/kg 2 veces al día) y en el tratamiento de la discospondilitis del perro por diseminación sistémica de S. aureus. Efecto sinérgico con B-lactámicos, aminoglucósidos, clindamicina y metronidazol.

**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** Enrofloxacin.

**Dosis:** 5 mg/kg de peso corporal por 5-10 días.

Encaso de Ehrlichiosis mantener el tratamiento por 15 días y administrar la dosis con intervalos de 24 horas. 1 tableta diaria por cada 10 kg de peso corporal por 5-10 días consecutivos o según indicaciones del Médico Veterinario.

**78030** Enrofloxacin 100 tabletas

**70831** ENROFLO. 50mg 500 tab.

**70832** ENROFLO. 50mg blister 10 ud.



## CIPROFLOXACINA

**Indicaciones:** Control y tratamiento de enfermedades respiratorias, digestivas y genitourinarias causadas por microorganismos sensibles como: Klebsiellas, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, Haemophilus, Estreptococos y Estafilococos. Infecciones del oído, ojos, riñón y vías urinarias eferentes, infecciones de piel, huesos y articulaciones, sinusitis y neumonías entre otras. Como profilaxis y tratamiento de infecciones en pacientes inmuno suprimidos.

**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** Ciprofloxacina.

**Dosis:** 1 tableta por cada 10kg cada 12 horas por 5 días consecutivos.

**Contraindicaciones:** No debe ser administrada con Hierro, antiácidos o Zinc. Puede potenciar el efecto de la Warfarina, no combinar con Teofilina y cefalosporinas. Ejerce efecto sinérgico con aminoglucósidos o B-lactámicos.

**70835** CIPROFLOXACINA 250mg 10 tabl.



## OXITETRACICLINA L.A.

**Indicaciones:** Control y tratamiento de enfermedades infectocontagiosas como: Carbón sintomático, carbón bacteridiano, edema maligno, septicemia hemorrágica, leptospirosis, actinomicosis, infecciones del ombligo, glándula mamaria, piel o las pezuñas y en general cualquier infección de los aparatos respiratorio, digestivo o genitourinario en bovinos, ovino, caprinos, equinos, porcinos y caninos, problemas de ANAPLASMOSIS bovina y ehrlichiosis canina y equina.

**Vía de administración:** Intramuscular o subcutánea.

**Fórmula:** Oxitetraciclina 20g,

**Dosis:** 20 mg/kg de peso vivo.

**70269** OXITETRA. 20% L.A. 20ml

**70270** OXITETRA. 20% L.A. 50ml

**70271** OXITETRA. 20% L.A. 100ml

**70272** OXITETRA. 20% L.A. 250ml

**70273** OXITETRA. 20% L.A. 500ml



## OXITETRACICLINA 5%

**Indicaciones:** Control y tratamiento de enfermedades infectocontagiosas como: carbón sintomático, carbón bacteridiano, edema maligno, septicemia hemorrágica, leptospirosis, actinomicosis, infecciones del ombligo, glándula mamaria, piel o las pezuñas y en general cualquier infección de los aparatos respiratorio, genitourinario y digestivo en bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y caninos, problemas de ANAPLASMOSIS bovina y ehrlichiosis canina y equina.

**Vía de administración:** Intramuscular, subcutánea o intravenosa lenta.

**Fórmula:** Oxitetraciclina HCL 5g.

**Dosis:** Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos 0,5 - 2 ml / 10 kg;

Caninos 2 - 3 ml / 10 kg, Aves 0,5 ml.

**70913** OXITETRACICLINA 5 % 50ml

**70912** OXITETRACICLINA 5 % 100ml

**70886** OXITETRACICLINA 5 % 250ml

**70895** OXITETRACICLINA 5 % 500ml



## CALOX Reconstituyentes Vitamínicos Mineralizantes

### CALCIO-DEXTROSA-FOSFORO- MAGNESIO

**Indicaciones:** Para el tratamiento de fiebre de leche, raquitismo, osteomalacia, hipocalcemia, afoforesis, toxicosis, trastornos neuromusculares, calcificación de fracturas, hipomagnesemia. Como coadyuvante en el crecimiento y desarrollo de becerros, potrillos y en el restablecimiento del equilibrio electrolítico luego de la deshidratación.

**Vía de administración:** Intravenosa lenta o intraperitoneal.

**Fórmula:** Cluconato de Calcio, Hidróxido de Magnesio, Acido de Hipofosforoso, Dextrosa Anhídra.

**70315** CAL-DEXT-FOS-MAG 250 ML

**70318** CAL-DEXT-FOS-MAG 500 ML



### CALOXVIT

**Indicaciones:** Suplemento mineral y vitamínico para animales domésticos durante las etapas de reproducción, crecimiento y producción.

**Vía de administración:** Oral.

**Fórmula:** Acetato de vitamina A, DI-alfa-tocoferol acetato, Sulfato de cobre pentahidratado pre-aminoácido quelatado, Sulfato de hierro y/o Carbonato de hierro Sulfato de maganeso, yodato de calcio anhidro Y/o EDDI, Sulfato/Oxido de Zinc, Selenito de Sodio, Carbonato de Cobalto, Sabor artificial a Frutas, etc.

**Dosis:** Suministrar puro, Bovinos: 70 a 120 grs, Ovinos y Caprinos: 15 a 40 grs, Porcinos 40 a 50 grs, Aves de Corral 25 a 30 kg por tonelada métrica de alimento balanceado, Equinos 40 a 50 grs animal por día.

**70056** CALOXVIT 1KG

**70055** CALOXVIT 20KG



### NUTRICALOX ENGORDE

**Indicaciones:** Suplemento mineral y vitamínico para bovinos de carne en la etapa de crecimiento y engorde.

**Modo de uso:** se recomienda suministrar a libre voluntad con la finalidad de alcanzar los objetivos de consumos que son entre 150 y 200 grs por animal por día para una mayor ganancia de peso, mejor la conversión alimenticia, favorecer el consumo de materia seca y mejor calidad de canal.

**Fórmula:** Vitaminas, Sulfatos, Magnesio, Carbonato, Proteinato, etc.

**70054** NUTRICALOX 20 KG



# CALOX

## Reconstituyentes Vitamínicos Mineralizantes



### COMPLEJO B FORTE CALOX

PRODUCTO  
NUEVO

**Indicaciones:** Para el tratamiento de las deficiencias en vitaminas del complejo B.

**Vía de administración:** Intramuscular o Subcutánea.

**Fórmula:** Cianobalamina, Vitamina B1 (Tiamina HCl), Vitamina B2 (Riboflavina 5 fosfato), Vitamina B3 (Nicotinamida), Piridoxina como pisolato, Aspartato de magnesio, Aspartato de potasio, Ácido pangámico (Vitamina B15), Lidocaína HCl  
Excipientes c.s.p.

**Dosis:**

Perros y gatos: 0.25ml/kg

Potros y terneros: 1ml/30kg

Lechones: 1-2ml

Porcinos: 4ml

Ovinos: 2-6ml

Equinos y Bovinos adultos: 10ml

Bovinos lecheros: 1ml/70kg

Aves: 0.5ml cada 3 días

**70032** COMPLEJO B CALOX FRASCO 100ML

**70033** COMPLEJO B CALOX FRASCO 250ML



### FORTI CALOX B-12

PRODUCTO  
NUEVO

**Indicaciones:** Para el control y tratamiento de las deficiencias de las vitaminas presentes en la composición, como en las de calcio y fósforo (hipocalcemias, raquitismo).

**Vía de administración:** Oral.

**Fórmula:** Fosfato dicálcico USP, Vitamina D3, Vitamina A, Vitamina B1, B2, B6, Nicotinamida, Vitamina B12.

Excipientes c.s.p.

**Dosis:**

Lechones: 120ml/30kg

Terneros y potros: 150ml/45kg

**71015** FORTICALOX B12 ORAL FCO 500ML



CALOX  
Reconstituyentes Vitamínicos  
Mineralizantes

Comprometidos con el bienestar de sus animales

## VITAMINAS Y MINERALES CALOX

**Indicaciones:** Suplemento de macrominerales, microminerales, vitaminas, probióticos y enzimas para ganado bovino de carne, bovino de leche, caprinos, ovinos, porcinos, equinos y aves de corral. Una parte de los microminerales se encuentran en forma de quelatos lo que los hace más biodisponibles y bioactivos que los provenientes de las sales inorgánicas. El contenido de probióticos y enzimas, aumentan la digestibilidad de los forrajes y alimentos concentrados. Favorece el mejoramiento de las funciones fisiológicas del animal. Mayor aporte de hierro y manganeso, lo que se traduce en un aumento de la función de transporte de oxígeno a los tejidos y una reducción de problemas de parto. Altamente palatable porque tiene sabor a naranja, lo que permite administrarse solo o mezclado con el alimento. Puede ser utilizado en todas las especies animales de diferentes propósitos y diferentes etapas de vida. Vía de administración: Oral. Fórmula: Calcio + Fósforo + Magnesio + Manganeso + Zinc + Cobre + Hierro + Yodo + Cobalto + Selenio + Vitamina A, D3, E + Proteinatos + Probióticos + Enzimas digestivas.

**Dosis:** puede suministrarse puro o mezclado (1:1) en dosis de 60 a 120g por animal por día, según la etapa del ciclo productivo (crecimiento, lactancia, secado). En aves de corral 2,5kg por tonelada de alimento.

**70051** VITAMINAS Y  
MINERALES 1kg

**70053** VITAMINAS Y  
MINERALES 20kg



## MULTIVITAMINAS CRECIMIENTO

Masticables sabor a hígado

**Indicaciones:** Suplemento nutricional a base de vitaminas y minerales, para perros y gatos en crecimiento. Con aceite de pescado (como fuente de ácido graso omega 3 y 6) que favorece un adecuado desarrollo y además un pelaje sano y brillante.

**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** Vitamina A, D3, E, B1, B2, B6, B12 + Niacinamida + Ácido Fólico + Ácido Pantoténico + Calcio + Hierro + Fósforo + Yodo + Magnesio + Zinc + Cobre + Manganeso + Potasio + Colina + Levadura de cerveza + Aceite de Pescado.

**Dosis:** para mascotas de hasta 11,36kg (25lb) de peso 1 tableta diaria. Para mascotas de más de 11,36kg (25lb) de peso 2 tabletas diarias.

**70600** MULTIVITAMINAS PERROS Y  
GATOS CRECIMIENTO 60tabl



# CALOX

## Reconstituyentes vitamínicos Mineralizantes

### MULTIVITAMINAS ADULTO

Masticables sabor a hígado

**Indicaciones:** Suplemento nutricional a base de vitaminas y minerales, para perros y gatos adultos. Con aceite de pescado (como fuente de ácido graso omega 3 y 6) que favorece un adecuado desarrollo y además un pelaje sano y brillante.

**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** Vitamina A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12 +Niacinamida + Ácido Fólico +Biotina + Ácido Pantoténico + Calcio + Hierro + Fósforo + Yodo + Magnesio + Zinc + Cobre + Manganeso + Potasio + Colina + Levadura de cerveza + Aceite de Pescado.

**Dosis:** para mascotas de hasta 11,36kg (25lb) de peso 1 tableta diaria. Para mascotas de más de 11,36kg (25lb) de peso 2 tabletas diarias.

70602 MULTIVITAMINAS PERROS Y GATOS CRECIMIENTO 60tabl



### MULTIVITAMINAS GERIÁTRICO

**Indicaciones:** Suplemento nutricional a base de vitaminas y minerales, para perros y gatos adultos geriátricos. Con aceite de pescado (como fuente de ácido graso omega 3 y 6) que favorece un adecuado desarrollo y además un pelaje sano y brillante.

**Vía de administración:** oral. (Masticables sabor a hígado)

**Fórmula:** Vitamina A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12 +Niacinamida + Ácido Fólico +Biotina + Ácido Pantoténico + Calcio + Hierro + Fósforo + Yodo + Magnesio + Zinc + Cobre + Manganeso + Potasio + Cloridrato de Glucosamina+ Levadura de cerveza + Aceite de Pescado.

**Dosis:** para mascotas de hasta 11,36kg (25lb) de peso 1 tableta diaria. Para mascotas de más de 11,36kg (25lb) de peso 2 tabletas diarias.

70603 MULTIVITAMINAS PERROS Y GATOS GERIÁTRICO 60tabl



CALOX  
Reconstituyentes vitamínicos  
Mineralizantes

## ALERGODEX

**Indicaciones:** Antialérgico y antiinflamatorio. Para todas las afecciones alérgicas, eccemas, enfermedades del colágeno, quemaduras y cauterizaciones.

En inflamaciones como miositis, artrosis, sinusitis, bursitis, tendovaginitis, artritis, asma bronquial. Como coadyuvante en terapia con antibióticos y otros procesos donde sea beneficioso el efecto farmacodinámico glucocorticoide.


También incrementa la tolerancia general a infecciones como mastitis, bronquitis, neumonías y otras afecciones respiratorias y digestivas.

**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** Dexametasona.

**Dosis:** Perros: pequeños ½ tableta, medianos 1-2 tabletas, grandes 2-3 tabletas. Gatos 0,25-0,5mg (1 tableta por animal). En casos crónicos 0,03-0,6mg/kg por cada día, durante los 3 primeros días.

**70020** ALERGODEX 0.5mg X 100tabl.



## PREDNISONA

**Indicaciones:** Antialérgico y antiinflamatorio de corta acción (12-36 horas).

Tratamiento de los síntomas asociados con dermatitis alérgicas, prurito de las dermatosis caninas, dermatitis alérgicas por pulgas, alergias locales, choque endotóxico, hemorrágico y anafiláctico. En procesos inflamatorios causados por exceso de trabajo, traumatismo o secuelas de enfermedades infecciosas.

**Vía de administración:** oral.

**Fórmula:** Prednisona.

**Dosis:** 1 tableta/20 kg/día es decir 50 mg/20 kg. Dosis de choque: 15-30 mg/kg

**70222** PREDNI. 5mg caja con 10 tab.

**70223** PREDNI. 50mg caja con 10 tab.

**70324** PREDNI. 5mg caja con 100 tab.



## MELOXICAM

**Indicaciones:** eficaz como antiinflamatorio y analgésico en procesos artríticos agudos y crónicos. Reduce el dolor antes y después de la cirugía. No altera el sistema endocrino.

**Vía de administración:** Oral.

**Fórmula:** Meloxicam.

**Dosis:** 0,2mg/Kg el primer día (1 tabl p/cada 10kg) y posteriormente 0,1mg/kg (1 tabl p/cada 20kg) cada 24 horas.

**75110** MELOXICAM 2mg  
caja c/100 tab.

**75111** MELOXICAM 2mg  
blister c/10 tab.



## LORATADINA

**Indicaciones:** Antihistamínico no corticoide, sin acción sedante, de efecto prolongado y con actividad selectiva antagonista de los receptores H periféricos.

Eficaz en el tratamiento de los síntomas asociados con rinitis alérgicas, sinusitis, alergias a drogas o alimentos, conjuntivitis alérgica, urticaria y otras afecciones dermatológicas, tales como la dermatitis atópica o dermatitis alérgica por pulgas.

**Vía de administración:** 10 mg ó 1 tableta por animal adulto cada 24 horas. En cachorros 1/2 tableta.

**Fórmula:** Loratadina.

**Dosis:** 10 mg ó 1 tableta por animal adulto cada 24 horas. En cachorros 1/2 tableta.

**70838** LORAT. 10mg caja c/10 tab.

**70847** LORAT. 10mg caja c/100 tab.



## CARPROFENO CALOX 100 mg TABLETAS PALATABLES

**PRODUCTO  
NUEVO**

**Indicaciones:** Reduce la inflamación y el dolor producido por trastornos músculo esquelético y articulares degenerativos. Continuación de analgesia parenteral en el control del dolor postquirúrgico.

**Presentación:** Caja con 100 tabletas, blíster con 10 tabletas.

**Vía de administración:** Oral

**Fórmula:** Cada tableta contiene 100 mg de Carprofeno.

**Dosis:** 2,2 mg por kg de peso vivo, 2 veces por día o 4,4 mg por kg de peso vivo, 1 vez al día. (En dosis de 4.4 mg/kg es equivalente a 1 tableta por cada 22 kg 1 vez al día)

**70911** Blister 10 tabletas

**70910** Caja 100 tabletas



## TRAMADOL CALOX 20 mg TABLETAS PALATABLES

**PRODUCTO  
NUEVO**

**Indicaciones:** Analgésico utilizado en pacientes que requieren tratamiento agudo o crónico para dolor leve a moderado de tejidos blandos y musculo esquelético.

**Presentación:** Caja con 10 tabletas.

**Vía de administración:** Oral

**Fórmula:** Cada tableta contiene 20 mg de tramadol Clorhidrato.

**Dosis:** Caninos: Administre 2-5 mg/kg cada 6-8 horas hasta por 14 días o según indicación del Médico Veterinario. Felinos: Administre 2-4 mg/kg cada 8-12 horas hasta por 14 días o según indicación del Médico Veterinario. (En dosis de 4 mg/kg es equivalente a 1 tableta por cada 5 kg cada 6-8 horas)

**70914** Blister 10 tabletas



### KETOPROFENO CALOX

**Indicaciones:** como tratamiento antiinflamatorio y analgésico de enfermedades del sistema musculoesquelético y osteoarticular. También en dolor post-quirúrgico y post-traumático. Además, se indica como coadyuvante en el tratamiento de cólico equino, mastitis y enfermedades respiratorias.

**Presentaciones:** Frasco 50 ml.

**Fórmula:** Ketoprofeno 100 mg | Excipientes c.s.p. 1 mL

**Administración:** Uso Intramuscular, intravenosa o intravenosa lenta.

**Advertencias:**

No utilizar en hembras preñadas, animales con gastroenteritis, ni animales menores de 6 semanas de nacidos.

No administrar conjuntamente con corticosteroides, diuréticos ni anticoagulantes.

**Periodo de retiro:**

Carne: 4 días.

Leche: no tiene periodo de retiro.

**Dosificación:**

Equinos: 2,2 mg/kg por día (1 ml/45 kg/día). Vía IV

Bovinos: 3 mg/kg por día (1 ml/33 kg/día). Vía IV o IM

Porcinos: 3 mg/kg por día (1 ml/33 kg/día). Vía IM.

71026 KETOPROFENO CALOX FRASCO 50 ML



PRODUCTO  
NUEVO

### FLUNIXIN MEGLUMINE CALOX

**Indicaciones:** Para el control de la inflamación aguda; se recomienda por tener efecto antipirético y analgésico en las enfermedades que presenten inflamaciones agudas en el ganado bovino. En porcinos se recomienda como ayuda en el tratamiento concomitante del síndrome MMA (mastitis, metritis, agalactia) o fallo en la lactación en las cerdas.

En equinos se recomienda para el alivio de la inflamación y del dolor asociados con trastornos osteo-musculares en el caballo y para el alivio del dolor visceral asociado al cólico.

**Presentaciones:** Frasco 50 ml.

**Fórmula:** Flunixin meglumina 83 mg (equivalente a Flunixin base 50 mg)

**Administración:** Uso Intramuscular, intravenosa u intravenosa lenta.

**Dosificación:**

Bovinos: 2,2 mg/kg (2 mL/45 kg) cada 24 horas durante 2 ó 3 días. Vía IV lenta.

Porcinos: 2,2 mg/kg (2 mL/45 kg). Vía IM ó IV lenta.

Equinos: 1,1 mg/kg (1 mL/45 kg) Cada 24 horas durante 5 días. Vía IV o IM.

71025 FLUNIXIN MEGLUMINE CALOX FRASCO 50 ML



PRODUCTO  
NUEVO

CALOX  
Analgésicos

## ANTICONCEPTIVO INYECTABLE

**Indicaciones:** Para la prevención del estro en caninos y felinos hembras en anestro. La Medroxiprogesterona se absorbe con facilidad, administrada en dosis suficiente produce inhibición de la secreción de gonadotropina por la hipófisis y como consecuencia no se desarrollan folículos en el ovario. La Hembra no presenta estro.

**Vía de administración:** Subcutánea.

**Fórmula:** Medroxiprogesterona acetato.

**Dosis:** Caninos y Felinos: 1 ml o 50 mg por animal adulto durante el anestro ó 150 después del último celo. Repetir cada 6 meses.

**70017** ANTICONCEPTIVO INYECTABLE 12 ampollas/1ml



## OMEPRAZOL

**Indicaciones:** tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales. Úlcera duodenal y gástrica, esofagitis por reflujo graves o refractaria. Estados patológicos dependientes de hipersecreción. Se recomienda su uso para gastritis.

**Vía de administración:** oral preferiblemente en ayunas.

**Fórmula:** Omeprazol.

**Dosis:** Caninos y felinos 0,5-2mg/kg dependiendo de si es preventivo o curativo la dosis puede variar. Úlcera gastroduodenal: se recomienda administrar una dosis de 20mg una vez al día por animal adulto. Úlcera gastroduodenal refractaria: 40mg (2 cápsulas) una vez al día. Esofagitis por reflujo: 20mg/día.

**70991** OMEPRAZOL 20mg X 7 cápsulas.



## SUCRALFATO 10%

**Indicaciones:** Tratamiento de úlceras orales, esofágicas, gástricas y duodenales. Además se utiliza en la prevención de erosiones gástricas inducidas por fármacos.

**Vía de administración:** Oral.

**Fórmula:** Sucralfato.

**Dosis:** Caninos: 5ml a 10ml cada 8 horas o según criterio Médico Veterinario. Felinos: 0.25ml a 5ml cada 8-12 horas o según criterio Médico Veterinario.

**70850** SUCRALFATO CALOX 10% SUSP. 120ML



## CALOX Cicatrizantes

### CIPER-CLOR

**Indicaciones:** Matagusanos, larvicida, repelente, cicatrizante, antibiótico y antiséptico. Preventivo y curativo de gusaneras e infecciones provocadas por herida accidental o quirúrgica, castraciones, corte de cola, marcaciones, cura de ombligos. Con efecto larvicida, adulticida y repelente de moscas, cicatrizante por su contenido antibiótico, ejerciendo así su efecto antiséptico y cicatrizante. Especies: equinos, caninos, bovinos, caprinos, ovinos y animales de zoológicos. En felinos bajo supervisión veterinaria.

**Vía de administración y dosis:** como preventivo rociar el área afectada y sus alrededores una o dos veces por semana a una distancia de 10 a 20 cm.

Como cicatrizante aplicar cada 48 horas. Como repelente de ectoparásitos y moscas: rociar pequeñas cantidades de producto sobre el área que se desea proteger. Producto que no tiñe la piel ni el pelaje luego de su aplicación. Puede ser utilizado cada 24 horas. Resiste la lluvia.

**Fórmula:** Cipermetrina 1,4% + Violeta de genciana + Aceite de pino y de citronella.



70022 CIPER-CLOR SPRAY 295gr

### CREMA CICATRIZANTE

**Indicaciones:** En animales domésticos como perros, gatos, equinos, bovinos, cerdos, ovinos, aves de corral u ornamentales como: antibiótico, antimicótico, antiinflamatorio y cicatrizante de uso tópico eficaz para el tratamiento de todo tipo de problemas de la piel que cursen con inflamación, alergia y afecciones complicadas por infecciones bacterianas o micóticas. Contiene Oxido de Zinc que ayuda a prevenir la aparición de las rozaduras y los riesgos de infección, además de proteger la piel tiene efecto astringente y antiséptico.

**Vía de administración:** Aplicar cantidad suficiente sobre el área afectada dos veces al día hasta su completa cicatrización. El producto es completamente atóxico por lo que puede ser utilizado sin ningún riesgo en cualquier especie animal.

**Fórmula:** Clotrimazol + Gentamicina sulfato + Acetato de Hidrocortisona + Oxido de Zinc

**Dosis:** tópica

70225 CREMA CICAT. FUNGICIDA 15gr.

70224 CREMA CICAT. FUNGICIDA 50gr.



# CALOX

## Antiséptico e higiene bucodental

### CLORHEXIDINA CALOX

**Indicaciones:** Antiséptico de heridas, quemaduras y/o ulceraciones en la piel y del conducto auditivo. Para tratamientos de gingivitis, alveolitis, estomatitis y de placa dental.

Medicamento listo para usar apto para su uso en diferentes especies animales como felinos, caninos, bovinos, caprinos, equinos, ovinos y porcinos. Como preparación antiséptica prequirúrgica, desinfección instrumental quirúrgico y de equipo diagnóstico.

**Fórmula:** Clorhexidina gluconato 0,5%, | Excipientes c.s.p

**Presentaciones:** Frasco de 120 ml.

**Administración:** Tópica, ótica y bucofaringea. Instrumental quirúrgico y de equipo diagnóstico.

**Dosificación:** En el caso de piel, mucosas y conducto auditivo aplique directamente en el área a tratar dos veces al día o según recomendación del Médico Veterinario.

70024 CLORHEXIDINA CALOX 0.5% 120ML



**PRODUCTO  
NUEVO**

### DENTY -VET CALOX

**Indicaciones:** Para la higiene bucal de caninos y felinos. Como preventivo de gingivitis, caries y otras infecciones bucales, generadoras de placa y la consecuente halitosis. Antiséptico bucal, bactericida y antifúngico. Su espectro: *Streptococcus mutans*, *Streptococcus mitis*, *Streptococcus Rothia*.

**Presentación** frasco de 250 ml

**Vía de administración:** solución oral.

**Fórmula:** Xilitol 0.5 g y agua c.s.p 100 ml

**Dosis:** Agregar por cada litro de agua, 10 mL del producto utilizando el vaso dosificador. Cambie la solución cada 24 horas aunque no haya sido consumida en su totalidad.

70060 DENTY-VET FRASCO 250 ML.



**PRODUCTO  
NUEVO**

**CALOX**  
Antiséptico e higiene bucodental

## LINVET CHAMPÚ ANTIALÉRGICO

**Indicaciones:** Antialérgico, antipruriginoso, hidratante y acondicionador.

Champú especialmente formulado para controlar síntomas cutáneos de las alergias caninas y felinas. Su composición a base de proteínas y ácidos poliinsaturados esenciales para la epidermis, lo hace altamente eficaz frente a procesos excematosos e inflamatorios de la piel de perros y gatos. Acondiona, hidrata y limpia la piel y pelaje del animal, disminuyendo el prurito y en consecuencia mejorando el estado general y el bienestar de sus mascotas. Ideal para mascotas con piel delicada, seca o descamada.

**Modo de uso:** Mojar completamente el pelo, agitar el envase y aplicar suficiente cantidad de champú, frotar con los dedos para facilitar la penetración del mismo, dejar actuar por 3 minutos y enjuagar con suficiente agua limpia.

**Fórmula:** Dexametasona 21-fosfato.

**70918** CHAMPÚ ANTIALÉRGICO 250ml



## LINVET CHAMPÚ BLANQUEADOR

**Indicaciones:** Blanqueador, humectante y acondicionador con pH balanceado contiene Aloe Vera, Proteínas, Aceite de Jojoba, panthenol. Está indicado para caninos o felinos de pelaje claro u oscuro, su blanqueador especial remueve las manchas de color amarillo, gris o verde en animales de pelaje claro o blanco producidas por las secreciones del ojo, por la comida o saliva sin irritar los ojos ni la piel, además elimina el sucio, manchas de aceite y grasa sin causar irritaciones. Elimina el exceso de grasa del pelo ejerciendo su efecto humectante sobre la piel. Su pH balanceado e ingredientes naturales garantizan los nutrientes y ácidos grasos esenciales para mantener el brillo, lozanía y salud tanto del pelaje como de la piel.

**Modo de uso:** Mojar completamente el pelo del animal, aplicar suficiente cantidad de champú Dermocan blanqueador y frotar hasta formar espuma, deje actuar por 5 minutos para que ejerza su efecto removedor y nutritivo, enjuagar con abundante agua limpia.

No irrita los ojos.

**Fórmula:** Aloe Vera incoloro + Nutrilar.

**70917** CHAMPÚ BLANQUEADOR 250ml.



## CALOX Cosméticos y Específicos

### LINVET CHAMPÚ CIPERMETRINA

**Indicaciones:** Pulguicida, piojicida, sarnicida, garrapaticida, elimina el exceso de grasa humectando la piel y dejando un agradable olor a pino que actúa como repelente de acción desodorante. La Cipermetrina actúa sobre el parásito aumentando la actividad espontánea, seguido de una excitación general que culmina en una parálisis por bloqueo de la transmisión nerviosa.

**Modo de uso:** Mojar completamente el pelo del animal, aplicar el champú y frotar hasta formar abundante espuma. Dejar actuar por 10 minutos, enjuagar varias veces con agua limpia y secarlo. Puede ser utilizado semanalmente.

**Fórmula:** Cipermetrina.

**Advertencias:** No usar en gatos.

**70915** CHAMPÚ LINVET C/CIPER. 200ml

**70920** CHAMPÚ LINVET C/CIPER. Litro



### LINVET CHAMPÚ EQUINO CON CIPERMETRINA

**Indicaciones:** Control y prevención de ectoparásitos: garrapatas y ácaros de la sarna. Limpia, desodoriza y embellece el pelaje.

**Modo de uso:** Después de humedecer bien el pelo, aplicar suficiente champú masajear vigorosamente hasta formar abundante espuma, dejar actuar 10 minutos y enjuagar con abundante agua limpia. Repita el tratamiento una vez por semana.

**Fórmula:** Cipermetrina.

**70007** CHAMPÚ LINVET C/CIPER/CAB Litro.

**70008** CHAMPÚ LINVET C/CIPE/CAB Galón



## FLUCONAZOL


**Indicaciones:** Para el tratamiento de la micosis sistémica, incluyendo la meningitis Criptocócica, Blastomicosis e Histoplasmosis. También puede ser útil en Candidiasis superficial y dermatofitosis, en el tratamiento de Malassezia sp.

**Vía de administración:** Oral.

**Dosis:** Caninos: 2.5-5mg/kg cada 24 horas (1 tableta/20 kg p.v) por 3 semanas consecutivas. Felinos: 2.5-10mg/kg cada 12 horas (1 tableta/10 kg p.v) por 3 semanas consecutivas. No es recomendable usarse en pacientes hipersensibles a este u otros azoles antifúngicos, ni con alteraciones en la función hepática, ni durante la preñez.

**Fórmula:** Fluconazol 100mg y Excipientes c.s.p 1 tableta.

**70220** FLUCONAZOL



## LIMPIADOR BUCAL

**Indicaciones:** Para dejar un aliento fresco en la mascota. Cuenta con propiedades naturales antiinflamatorias que ayudan a prevenir la placa, sarro y mal aliento.

**Modo de uso:** Presione el atomizador en el hocico, a cada lado de la encía del animal, con un pequeño masaje, se puede aplicar varias veces al día. Según criterio del veterinario.

**Fórmula:** Extrato de caléndula + aceite clavo de olor + excipientes.

**70215** LIMPIADOR BUCAL (SPRAY 60ML)



## LIMPIADOR ÓTICO

**Indicaciones:** Como coadyudante en la eliminación de la suciedad y restos de cera en el espacio auricular. Restablece el PH normal en el canal auricular y previene infecciones óticas.

**Modo de uso:** Colocar unas gotas en el canal auricular y en la base de la oreja y con una gasa limpiar la oreja, se puede utilizar una o dos veces por semana.

Según criterio veterinario.

**Fórmula:** extracto de manzanilla + Extrato de caléndula  
Ácido Acético

**70216** LIMPIADOR ÓTICO (SPRAY 60ML)



## CALOX Específicos y Naturales

### PIEL Y PELO

**Indicaciones:** Suplemento natural nutricional que aporta componentes ricos en Vitaminas A, D, E y ácidos grasos esenciales, así como Omega 3,6 y 9; coadyudante en el control de la caída del pelo, regeneración de la piel y mucosas en caninos y felinos, por sus efectos antiinflamatorios contribuyen a una rápida regeneración del folículo piloso, así como de las células epiteliales formadoras de piel y mucosas.

**Modo de uso:** e 22 kg en adelante 1 tableta, menos de 22kg media tableta.

**Fórmula:** Varios naturales (palmitato de vitamina A, colecalciferol, dl-alfa acetato de tocoferol, óxido de zinc, aceite de borraja en polvo, aceite de pescado)

**70218** PIEL Y PELO



### TRANQUILIZANTE

**Indicaciones:** Suplemento natural nutricional y coadyudante complementario en los tratamientos tranquilizantes durante situaciones de estrés.

**Modo de uso:** administrar directamente en el hocico o mezclado con el alimento previo al viaje, citas al veterinario o durante una tormenta. Administrar por cada 22 kg en adelante 1 tableta, menos de 22kg media tableta.

**Fórmula:** Varios naturales (Vitamina B1, B3, vitamina B6, extracto de Passiflora, levadura de cerveza deshidratada, etc)

**70219** TRANQUILIZANTE



## CALOX Específicos y Naturales

### ENZICALOX

**Indicaciones:** Suplemento nutricional en tabletas saborizadas para caninos y felinos que ayuda a mejorar la digestión de las proteínas, grasas y carbohidratos, con probióticos que promueven la absorción de nutrientes y estimulan el sistema digestivo e inmunológico. Además ayuda a reducir los olores en las heces y la orina de las mascotas.

**Fórmula:**

Raíz de Yucca schidigera 300 mg  
Hoja de perejil (Petroselinum crispum) 150 mg  
Flor de manzanilla ( Matricaria chamomilla) 100 mg  
Bacillus coagulans 80 mg  
Amilasa 4 mg  
Lipasa 0,50 mg  
Celulosa 10 mg  
Proteasa 0,05 mg  
Fructooligosacáridos 30 mg

**Presentación:** Frasco con 60 tabletas masticables.

**Administración:** Vía oral, se puede mezclar con el alimento.

**Dosificación:**

Cachorros y gatitos: 1/2 Tableta diaria.  
Perros y gatos adultos hasta 10kg de peso: 1 Tableta diaria.  
Perros de 10 a 20 kg de peso: 1-2 Tabletas diarias.  
Perros de más de 20 kg de peso: 2-3 Tabletas diarias.  
Cuando la dosis es superior a una tableta diaria, se recomienda dividirla en 2 tomas (una en cada ración de comida).

70025 ENZICALOX 1650 MG X 45 TABLETAS



### ANTIALÉRGICO NATURAL

**Indicaciones:** Suplemento natural nutricional y coadyudante en el control de procesos alérgicos en caninos y felinos. Ayuda a controlar las alergias y el proceso inflamatorio que se deriva y contribuye como antioxidante. El Quercetin es un suplemento natural nutricional que actúa sobre las células del mástil previniendo la degranulación de estas y por lo tanto la liberación de la histamina, enzima responsable de los procesos alérgicos.

**Modo de uso:** de 22 kg en adelante 1 tableta, menos de 22kg media tableta. Puede ser utilizado por tiempo indefinido ya que no se acumula en órganos ni en tejidos.

**Fórmula:** Varios naturales (Calcio, Vitamina C, Biotina, Quercetina, Bromelina, Cúrcuma, Lipasa, Lactasa, Semilla de Uva, etc).

70217 ANTIALERGICO.





**DISTRIBUYE:**



**Comprometidos con el bienestar de sus animales**

## CANNALUV CBD 500 MG

**Indicaciones:** es un suplemento nutricional y coadyuvante en estados de ansiedad y estrés, posee función antioxidante, aporta brillo y mantiene sana la piel y el pelaje.

**Presentación:** Frasco de 30 ml

**Vía de administración:** Oral

**Fórmula:** 500 mg de Cannabidiol extraído de cañamo (Cannabis Sativa L.) y 0.05 mg de vitamina B12, adicionalmente posee aceite de coco como aporte de triglicéridos de cadena media (MCT) aceite de salmón como aporte de ácidos grasos omega 3 (EPA Y DHA).

**Especie:** Felinos y Caninos

**Dosis:** Suministrar diariamente 1 gota por cada kg, aplicar en perros y gatos adultos a partir de los 12 meses de edad, suministrar a perros mayores de 1 kg a 18 kg de peso vivo.

**87001** CANNALUV (LÍNEA NATURAL) CBD 500 MG



## CANNALUV CBD 1000 MG

**Indicaciones:** es un suplemento nutricional y coadyuvante en estados de ansiedad y estrés, posee función antioxidante, aporta brillo y mantiene sana la piel y el pelaje.

**Presentación:** Frasco de 30 ml

**Vía de administración:** Oral

**Fórmula:** 1000 mg de Cannabidiol extraído de cañamo (Cannabis Sativa L.) y 0.05 mg de vitamina B12, adicionalmente posee aceite de coco como aporte de triglicéridos de cadena media (MCT) aceite de Salmon como aporte de ácidos grasos omega 3 (EPA Y DHA).

**Especie:** Caninos

**Dosis:** Suministrar diariamente 1 gota por cada 1.6 kg de peso corporal, aplicar en perros a partir de los 12 meses de edad, suministrar a perros mayores d 18 kg de peso vivo.

**87001** CANNALUV (LÍNEA NATURAL) CBD 1000 vMG



## CANNALUV CON TAURINA 500 MG

**Indicaciones:** es un suplemento nutricional y coadyuvante en estados de ansiedad y estrés, posee función antioxidante, aporta brillo y mantiene sana la piel y el pelaje.

**Presentación:** Frasco de 30 ml

**Vía de administración:** Oral

**Fórmula:** 500 Cannabidiol extraído de cañamo (Cannabis Sativa L.) y 0.05 mg de vitamina B12, 300 mg de taurina, adicionalmente posee aceite de coco como aporte de triglicéridos de cadena media (MCT) aceite de salmón como aporte de ácidos grasos omega 3 (EPA Y DHA).

**Especie:** Felinos y Caninos

**Dosis:** Suministrar diariamente 1 gota por cada kg, aplicar en perros y gatos adultos a partir de los 12 meses de edad, suministrar a perros mayores de 1 kg a 18 kg de peso vivo.

**87004** CANNALUV CON TAURINA 500 MG



## CANNALUV CON TAURINA 1000 MG

**Indicaciones:** es un suplemento nutricional y coadyuvante en estados de ansiedad y estrés, posee función antioxidante, aporta brillo y mantiene sana la piel y el pelaje.

**Presentación:** Frasco de 30 ml

**Vía de administración:** Oral

**Fórmula:** 1000 mg Cannabidiol extraído de cañamo (Cannabis Sativa L.) y 0.05 mg de vitamina B12, 300 mg de taurina adicionalmente posee aceite de coco como aporte de triglicéridos de cadena media (MCT) aceite de Salmon como aporte de ácidos grasos omega 3 (EPA Y DHA).

**Especie:** Caninos

**Dosis:** Suministrar diariamente 1 gota por cada 1.6 kg de peso corporal, aplicar en perros a partir de los 12 meses de edad, suministrar a perros mayores d 18 kg de peso vivo.

**87005** CANNALUV CON TAURINA 1000 MG



## LÍNEA NATURAL Suplemento

### CANNALUV CBD FULL SPECTRUM 500 MG

**Indicaciones:** es un suplemento nutricional y coadyuvante en estados de ansiedad y estrés, posee función antioxidante, aporta brillo y mantiene sana la piel y el pelaje.

Presentación: Frasco de 30 ml

**Vía de administración:** Oral

**Fórmula:** 500 mg de Cannabidiol full spectrum (CBD) y 0.05 mg de vitamina B12, adicionalmente posee aceite de coco como aporte de triglicéridos de cadena media (MCT) aceite de salmón como aporte de ácidos grasos omega 3 (EPA Y DHA).

**Especie:** Felinos y Caninos

**Dosis:** Suministrar diariamente 1 gota por cada kg, aplicar en perros y gatos adultos a partir de los 12 meses de edad, suministrar a perros mayores de 1 kg a 18 kg de peso vivo.

**87007** 500 MG

### CANNALUV CBD FULL SPECTRUM 1000 MG

**Indicaciones:** es un suplemento nutricional y coadyuvante en estados de ansiedad y estrés, posee función antioxidante, aporta brillo y mantiene sana la piel y el pelaje.

Presentación: Frasco de 30 ml

**Vía de administración:** Oral

**Fórmula:** 1000 mg de Cannabidiol full spectrum (CBD) y 0.05 mg de vitamina B12, adicionalmente posee aceite de coco como aporte de triglicéridos de cadena media (MCT) aceite de Salmon como aporte de ácidos grasos omega 3 (EPA Y DHA).

**Especie:** Caninos

**Dosis:** Suministrar diariamente 1 gota por cada 1.6 kg de peso corporal, aplicar en perros a partir de los 12 meses de edad, suministrar a perros mayores d 18 kg de peso vivo.

**87006** 1000 MG



## BEEF JERKY CBD

**Indicaciones:** Es un suplemento nutricional y coadyuvante en estados de estrés, ansiedad y dolor en perros y gatos.

**Presentación:** Contenido neto 50 g

**Vía de administración:** Oral

**Ingredientes:** Carne de Res deshidratada, Cannabidiol extraído de Cáñamo (Cannabis Sativa L.), sal cruda y ácido acético (vinagre).

**Análisis garantizado:**

Humedad (máx): 13%

Proteína Cruda (mín): 19%

Cannabidiol (CBD) (mín): 1.75%

Sal (mín): 1.00%

Sal (máx): 2.25%

**Dosis:** Suministrar máximo 10g diarios por cada 10kg de peso vivo.

**87010** BEEF JERKY CON CBD 50 GRS





DISTRIBUYE:



Comprometidos con el bienestar de sus animales

## OXITOCINA 20 U.I.

**Indicaciones:** producto indicado para la inducción al parto, inercia o atonía uterina, involución del útero tras cesáreas y disminución de hemorragias, expulsión de pares y restos de exudados tras el parto, iniciación a la lactación tras el parto, agalactia de cerdas, piometra y endometritis crónicas para provocar la expulsión de residuos del útero.

**Presentación:** Frasco de 250 ml

**Vía de administración:** Intramuscular, Intravenosa, Subcutánea


**Fórmula:** cada ml contiene 20 U.I. de Oxitocina sintética.

**Especie:** Bovinos, Porcinos, Caninos, Equinos, Felinos, Ovinos

**Dosis:**

| Especie         | Enfermedad o agente para tratar                      | Dosis           | Intervalo entre dosis | Duración de tratamiento |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>BOVINOS</b>  | Coadyuvante en la retención de la placenta           | 0.7 ml / 100 kg | 2 h                   | 1 d                     |
| <b>BOVINOS</b>  | Inducción de parto                                   | 1.5 ml / 400 kg | 30 min                | 1 d                     |
| <b>BOVINOS</b>  | Eyecciones de leche                                  | 1 ml / 400 kg   | 24 h                  | 1 d                     |
| <b>BOVINOS</b>  | Coadyuvante en metritis                              | 1 ml / 100 kg   | 3 d                   | 12 h                    |
| <b>EQUINOS</b>  | aumentar las contracciones uterinas                  | 3 ml / 200 kg   | 24 h                  | 1 d                     |
| <b>PORCINOS</b> | del síndrome M.M.A (Mastitis - Metritis - Agalactia) | 2 ml / 200 kg   | 24 h                  | 1 d                     |
| <b>OVINOS</b>   | Retención de placenta o atonía uterina               | 1 ml / 80 kg    | 24 h                  | 1 d                     |
| <b>CANINOS</b>  | Inducción del parto                                  | 0.25 ml / 10 kg | 30 min                | 1 d                     |
| <b>CANINOS</b>  | Coadyuvante en metritis aguda                        | 0.5 ml / 10 kg  | 1 h                   | 1 d                     |
| <b>FELINOS</b>  | Inercia uterina                                      | 0.25 ml / 2 kg  | 24 h                  | 1 d                     |

70900 OXITOCINA 250 mL



## COMPLEJO B+B12

### COMPOSICION:

Cada mL contiene:

Clorhidrato Tiamina ..... 5 mg  
 Riboflavina Fosfato sódico equivalente a Riboflavina ..... 0.1 mg Niacinamida..... 5 mg  
 Clorhidrato de Piridoxina..... 0.5 mg Cianocobalamina..... 0.002 mg.

### INDICACIONES:

Tratamiento de afecciones por deficiencia de vitaminas del complejo B, tales como inapetencia, baja conversión alimenticia y escasa producción, estrés producido por transporte, destete, cambio de régimen alimenticio, clima, parto, etc. Luego del tratamiento de enfermedades infecciosas o parasitarias, para favorecer una rápida recuperación. Preparación de los animales para exposiciones o competencias.

### VIA DE ADMINISTYRACION:

Intramuscular o sub-cutánea

### DOSIFICACION:

#### Dosis única.

Bovinos: Terneros 5-8 mL. Adultos 12-18 mL. Dosis única

Equinos: Potros 5-8 mL. Adulto: 12-18 mL.

Ovinos y Caprinos: Corderos y Cabritos: 1-2 mL. Adultos 2-3 mL.

Porcinos: Lechones: 1-2 mL. Adultos 3-5 mL.

Caninos y Felinos: 1 mL.

Aves 1.2 mL dosis única.



### PRESENTACION:

.Caja con 1 frasco de 100 mL.

Caja con 1 frasco de 250 mL.

**71014** COMPLEJO B + B12 250 mL

**71012** COMPLEJO B + B12 100 mL



## BIO-MAX

**Indicaciones:** BIO-MAX® esta indicado para estimular el apetito en los estados severos de desnutrición o carencia de vitamina minerales y microelementos como el zinc y el cobalto. BIO-MAX® indicado para mejorar la condición física general de los bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos BIO-MAX® ofrece un aporte adecuado de vitaminas, minerales y aminoácidos que ayudan que el animal se conserve fuerte, saludable; vigoroso también asegura las necesidades fisiológicas de la hembra gestante, lactante, de animales de desarrollo y animales adultos. Proporciona el pelo de su mascota un aspecto brillante y sedoso.

**Presentación:** Frasco de 120 ml

**Vía de administración:** Oral

**Fórmula:** cada ml contiene

| Principio activo                | Concentración |
|---------------------------------|---------------|
| Citrato de Hierro Amoniacal     | 0.7 mg        |
| Glucosheptonato de calcio       | 4 mg          |
| Glicina                         | 4 mg          |
| Acetato de dl-a-tocoferil       | 0.1 mg        |
| Acido ascórbico                 | 2 mg          |
| Clorhidrato de tiamina          | 0.3 mg        |
| Cloruro de sodio                | 0.8 mg        |
| Sulfato de zinc heptahidratado  | 11.33 µg      |
| Cloruro de cobalto              | 20 µg         |
| Sulfato de cobre Pentahidratado | 26 µg         |
| Cloruro de potasio              | 2.12 mg       |

**Dosis:**

| Especie | Dosis                          |
|---------|--------------------------------|
| Caninos | 5 ml cada 12 horas por 15 días |



70009 BIO-MAX 120 mL

## NEURO VITAMINAS GOTAS

**Indicaciones:** Indicado para neuritis, polineuritis: anemias, enfermedades hepáticas, deficiencia de vitaminas pérdida del apetito (anorexia), trastornos cardiovasculares de los animales.

**Presentación:** Frasco de 15 ml

**Vía de administración:** Oral

**Fórmula:** Cada ml contiene

| Principio activo       | Concentración |
|------------------------|---------------|
| Tiamina clorhidrato    | 20 mg         |
| Piridoxina clorhidrato | 20 mg         |
| Cianocobalamina        | 0.2 mg        |

**Especie:** Caninos, Felinos, Aves

**Dosis:**

| Especie | Dosis                              |
|---------|------------------------------------|
| Caninos | 20 gotas de 2 a 3 veces por semana |
| Felinos | 10 gotas de 2 a 3 gotas por semana |
| Aves    | 3- 5 gotas por semana              |

**70005** NEURO VITAMINAS GOTAS 15 mL





DISTRIBUYE:



Comprometidos con el bienestar de sus animales

## RED CELL CANINO

**Indicaciones:** suplemento nutricional que aporta vitaminas y minerales que coadyuva en el mantenimiento del perro durante el ejercicio continuo y preparación para exhibición, también perros debilitados, convalecientes, cachorros, geriátricos, perras en gestación y lactancia.

**Vía de administración:** Oral.

**Dosis:** Suministrar las siguientes cantidades de CANINE RED CELL junto con el alimento o alimentar directamente.

Perros y cachorros: 1 cucharadita por cada 4,53 kg de peso corporal. En criaderos: mezclar 115 ml (4 onzas) de CANINE RED CELL con el alimento y suministrar por cada 4,53 kg de peso corporal. Cantidades dobles se pueden ofrecer a los animales durante la gestación y la lactancia. Este producto está diseñado solo como alimentación suplementaria.

**Fórmula:** Magnesio, Potasio, Azufre, Cobre, Selenio, Zinc, Hierro, Cobalto,

Manganeso, yodo, Vitamina A, Vitamina D-3, vitamina E, Vitamina B-12, tiamina, Riboflavina, Vitamina B-6, Menadiona, Ácido fólico, Biotina, Colina, Ácido D-pantoténico, Niacinamida.

**70940** RED CELL CANINO 100 ML



## RED CELL EQUINO

**Indicaciones:** es un suplemento vitamínico-mineral alto en hierro para alimentación de caballos, formulado para proporcionar suplemento de vitaminas y minerales que pueden faltar o que no se encuentran en cantidades suficientes en la alimentación normal de un caballo, favorece el desarrollo muscular.

**Vía de administración:** Oral.

**Fórmula:** Magnesio, Potasio, Azufre, Cobre, Selenio, Zinc, Hierro, Cobalto, Manganeso, yodo, Vitamina A, Vitamina D-3, vitamina E, Vitamina B-12,

tiamina, Riboflavina, Vitamina B-6, Menadiona, Ácido fólico, Biotina, Colina, Ácido D-pantoténico, Niacinamida.

**Dosis:** Caballos en entrenamiento: 2 onzas líquidas de RED CELL todos los días. Los caballos sin entrenamiento: 1 onza líquida de RED CELL diaria. Suministrar RED CELL mezclado en la ración diaria de alimento o por vía oral con una jeringa de dosis.

**70933** RED CELL 946ML

**70944** RED CELL 1/2 GALÓN

**70945** RED CELL GALÓN



# FARNAM

## Reconstituyentes Vitamínicos Mineralizantes



### SECRETO DEL HERRERO

**Indicaciones:** suplemento nutricional que aporta minerales, ácidos grasos omega 3 y 6 y adecuados niveles de Biotina, como coadyuvante para salud de los cascos, menos grietas y paredes de los cascos sólidos, se logra ver la pared del casco nuevo y el casco más saludable.

**Vía de administración:** Oral.

**Fórmula:** Proteína cruda, Lisina, Metionina, Grasa cruda, Ácido graso Omega, Ácido graso Omega-6, Fibra cruda, Calcio, Fósforo, Cobre, Zinc, Biotina.

**Dosis:** 180g durante 4 semanas y luego pasar a 90g por día, para un caballo de 500 kg de peso.

**70935** SECRETO DEL HERRERO 2,5kg

**70932** SECRETO DEL HERRERO 5kg



### CRECIMIENTO DE POTRO

**Indicaciones:** Suplemento vitamínico mineral específico para potros durante sus primeros meses de vida y hasta completar su fase de crecimiento. Aporta 27 vitaminas y minerales esenciales para la nutrición del joven équido, contribuyendo, a que su crecimiento y desarrollo sean correctos y saludables.

**Vía de administración:** Oral.

**Fórmula:** Complejo de proteínas, minerales, vitaminas y aminoácidos.

**Dosis:** Se recomienda empezar a suministrarle al potro desde antes del destete en su ración de comida diaria y continuar haciéndolo hasta que cumpla 1 año. 2 onzas diarias. (Contiene copa dosificadora) Mezclar con la ración de comida diaria.

**70931** GROW COLT 1,7 kg



Comprometidos con el bienestar de sus animales

## RESPUESTA DEL POTRO

**Indicaciones:** Respuesta del Potro es un suplemento nutricional que contiene calostro bovino seco fortificado con nutrientes esenciales que se encuentran en un calostro de yegua saludable. Ideal para el cuidado inmediato del potro cuando el parto es prematuro o retrasado, cuando el acceso al calostro de yegua es limitado; o potros que necesitan apoyo adicional.

Respuesta del Potro proporciona a los recién nacidos, potros y destetados más viejos la nutrición que necesitan al nacer para estimular la respuesta inmune.

**Componentes:** Calostro seco bovino, Biotina, Ácido Fólico, Suplemento de Vitamina B12, Benzoato de Sodio y EDTA (como preservantes).

**Dosificación:** Calentar a 38 grados Celsius y administrar vía oral todo el contenido del tubo inmediatamente después del nacimiento, puede repetirse a criterio del especialista.

**70810** Respuesta del potro presentación de 30 gramos



## PESO SEGURO

**Descripción e indicaciones:** Peso Seguro es un suplemento nutricional que ayuda a que los caballos ganen peso y mantengan una masa corporal saludable. Desarrollado para caballos con dificultad para mantener su peso: estrés del entrenamiento o competición, recuperación tras enfermedades, trastornos metabólicos, etc. Peso seguro está indicado en situaciones en las que se precisa un aporte calórico extra como en . yeguas lactantes, potros, entrenamiento y competiciones, etc. Al mejorar la masa corporal y aumentar el aporte energético, optimiza el rendimiento en competición. Peso Seguro es rico en Omega 3: recomendado para mejorar el estado de piel y pelo. Muy útil en la preparación de caballos para ferias, exposiciones o venta.

Rápido efecto : contiene 2,5 veces más calorías que el grano, permite recuperar el peso y la apariencia del caballo en sólo 30 días.

Seguro: sin los riesgos de cólico, diarrea, infosura/laminitis, hiperexcitabilidad, asociados a una sobredosis de grano o concentrado.

Saludable: NO contiene grasas de origen animal, sólo de origen vegetal.

**Componentes:** Aceite vegetal, granos de maíz de destilería con solubles deshidratados, harina de lino estabilizada por calor, carbonato cálcico, ácido propiónico, tocoferoles naturales y BHT/BHA (como conservantes).

**Dosificación:** La medida que se incluye. Mezcle la dosis apropiada de Peso Seguro con la ración normal de grano:

- Para favorecer el buen estado de la piel y del pelo: 1 medida al día.
  - Para aportar energía y aumentar el peso corporal: 2 medidas al día.
  - Dependiendo del grado de actividad del caballo pueden administrarse hasta 4 medidas
- Dosis basadas en un caballo adulto de tamaño medio (500 kg de peso). Ajuste la dosis en función del peso: suministre más cantidad a los caballos más grandes y de razas de tiro, y menos a caballos miniatura, ponis, y potros.

**70805** PESO SEGURO 3,4 Kg



## FLUID FLEX

**Indicaciones:** Suplemento nutricional líquido para equinos y coadyuvante en la salud de las articulaciones

**Vía de administración:** Oral.

**Fórmula:** Clorhidrato de Glucosamina (mariscos), Bromelina, Yucca schidigera, Sulfato de condroitina, Colágeno derivado de péptidos, Zinc, Manganeso, Cobre, Bioflavonoides cítricos, Extracto de semilla de uva, Excipientes.

**Dosis:**

| PESO   | MANTENIMIENTO | TRAT  |
|--------|---------------|-------|
| 500 Kg | 30 ml         | 60 ml |

70930 FLUID-FLEX 946ml



## MARE PLUS

**Descripción e indicaciones:** Provee los nutrientes esenciales para la salud de la yegua preñada y su cría, durante el último tercio de gestación, previene el nacimiento de potros débiles por causas nutricionales.

Suplemento Nutricional para yeguas gestantes o lactantes. Mare plus, Mejora la condición corporal durante la lactancia temprana, Favorece el desarrollo fetal en el último tercio de gestación, Aumenta la calidad y cantidad de la leche.

**Vía de Administración:** Oral mezclado con el concentrado.

**Dosis: Mantenimiento:** 30 gramos por día, Gestación: 60 gramos diarios, Lactación: 90 gramos diarios.

**Presentación:** Envase plástico de 2.25 Kg

70942 MARE PLUS



## RED VIVAL

**Indicaciones:** Suplemento nutricional fortificado a base de Aminoácidos, Vitaminas, minerales, extractos de Yucca Schidigera y Algas. Específico para aves de producción de huevos o carne. Ideal para el recibo de pollitas o pollitos, para estados de estrés o posterior a tratamientos con antibióticos o antiparasitarios. Red Vival también está indicado en Abejas como suplemento nutricional en épocas de baja floración. Para mejorar la producción de miel y rendimiento general de la colmena.

**Via de Administración:** Oral, disuelto en el agua de bebida o con gotero al pico del ave.

**Dosis:**

**Aves:** 1mL por litro de agua de bebida o 4 mL por galon de agua.

**Abejas:** 5 mL por cada litro de solución azucarada.

**Presentación:** 30 mL, 100 mL, 500 mL, Litro y Galones.

**70954** 30mL

**70956** 100mL

**70958** Litro





Química  
**DELTA S.A**  
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

**DISTRIBUYE:**



**Comprometidos con el bienestar de sus animales**

## BIO HOME

**Indicaciones:** Producto a base de antibacterianos y donadores de oxígeno que en forma conjunta reducen la presencia de malos olores producto de la presencia de mascotas en el ambiente del hogar y vehículos.

**Modo de uso:** aplicar en forma de aspersión sobre sillones, alfombras, asientos de vehículos, camas de mascotas y otros sitios que emanan olores desagradables.

**Fórmula:** Peróxido de hidrógeno + Esencia + Alcohol

**97005** BIOHOME litro

**97006** BIOHOME galón



## OUT 220

**Indicaciones:** Compuesto por cuaternarios de amonio de quinta generación para la desinfección de instalaciones, salas de espera, pisos, consultorios, habitaciones y esterilizaciones de equipo médico y quirúrgico.

**Modo de uso:** Para desinfección usar 5ml por litro de agua, aplicar el producto previa limpieza. Para esterilización usar 12ml por litro de agua, dejar el producto en contacto con el equipo por lo menos 15 minutos, el equipo debe quedar totalmente cubierto por la solución.

**Fórmula:** Octyl decyl dimethyl ammonium chloride + Dietyl dimethyl ammonium chloride + Didecyl dimethyl ammonium chloride + Alkyl Dimethyl benzyl ammonium chloride.

**Advertencias:** evitar el uso de detergentes y jabones conjuntamente con OUT 220.

**97001** OUT 220 FRASCO 500ml

**97002** OUT 220 FRASCO 120ml





**DISTRIBUYE:**



**Comprometidos con el bienestar de sus animales**

## SOLUCIÓN SALINA

**Indicaciones:** para el tratamiento de deshidrataciones en animales domésticos (perros, gatos, bovinos, equinos, cerdos, ovinos y caprinos) y como vehículo para la administración endovenosa de fármacos.

**Vía de administración:** endovenosa, intraperitoneal ó subcutánea.

Fórmula: Cloruro de Sodio + Agua para inyección.

**Dosis:** Consulte al médico veterinario.

**Contraindicaciones:** No utilizar la solución cuando el producto presente precipitado o enturbiamiento. No se recomienda utilizar el excedente después de perforado el tapón. Almacenar en un lugar fresco y seco, manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.

**97072** SOLUCION SALINA 1 LITRO



## LACTATO DE RINGER

**Indicaciones:** para la reposición de líquidos y electrolitos en animales con desbalance electrolítico causado por padecimientos que conlleven a estados de acidosis y deshidratación. Tales como: diarreas agudas, post-operatorios, hemorragias, quemaduras, cólico equino y todo tipo de situaciones que provoquen pérdida de volumen circulatorio.

**Vía de administración:** Intravenosa lenta a través de equipo de venoclisis.

**Fórmula:** Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio + Cloruro de Calcio + Lactato de sodio

**Dosis:** Bovinos y Equinos 4.000 a 6.000 ml/día. Terneros y potros 2.000 a 3.000 ml/día. Perros y gatos 50 ml/kg/día, según la gravedad, el estado y el peso del animal y a criterio del médico veterinario tratante.

**Contraindicaciones:** debe administrarse con cautela en animales con deficiencia cardíaca o renal.

**97050** LACTATO 1 litro

**97051** LACTATO 2 litros

**97052** LACTATO 5 litros



# VARIOS

DISTRIBUYE:



Comprometidos con el bienestar de sus animales

## TABERNIL INSECTICIDA SPRAY

**Indicaciones:** Tratamiento y prevención de infestaciones por parásitos externos en canarios y aves de adorno en general.

**Fórmula:** Tetrametrina + Butóxido de piperonilo.

**Modo de uso:** Pulverizar por el cuerpo del animal durante unos segundos manteniendo el fresco a 50 cm de distancia, repetir cada 5 días. Para la desinfección de jaulas pulverizar una vez a la semana.

**8035** TABERNIL INSECTICIDA SPRAY



## TABERNIL ANTIASMÁTICO

**Indicaciones:** Tratamiento sintomático de los procesos respiratorios.

**Vía de administración:** Oral diluido en agua.

**Fórmula:** Difenhidramina HCL + Efedrina HCL + Teofilina + Dexametasona

**Dosis:** De 5 a 10ml por litro de agua de bebida o 5 a 10 gotas por 40ml de agua durante 5 días.

**8036** TABERNIL ANTIASMÁTICO 20ml



## TABERNIL DOXICICLINA

**Indicaciones:** Tratamiento de procesos infecciosos, respiratorios o digestivos causados por microorganismos sensibles a la doxiciclina.

**Vía de administración:** Oral diluido en agua.

**Fórmula:** Doxicilina.

**Dosis:** 5ml por cada 1.5 litros o 4 gotas por cada 60ml de agua de bebida durante 5 días consecutivos.

**8004** TABERNIL DOXICICLINA 20ml



## TABERNIL Varios

### TABERNIL MUDA

**Indicaciones:** Premezcla vitamínica para administrarse durante los períodos de muda.

**Vía de administración:** Oral.

**Fórmula:** Cloruro de colina + DL-Metionina + Vitamina B6 + Nicotinamida + Ácido pantoatéico.

**Dosis:** 6ml por kg de pasta de cría o bizcocho o 6 gotas por cada 40 g de pasta de cría o bizcocho, o 3ml por litro de agua equivalente a 3 gotas por cada 40ml de agua de bebida.

**8006** TABERNIL MUDA 20ml



### TABERNIL TOTAL

**Indicaciones:** Premezcla polivitamínica para administrar siempre que sea preciso incrementar el contenido vitamínico de la dieta.

**Vía de administración:** Oral diluida en agua de bebida o alimento.

**Fórmula:** Vitaminas + Aminoácidos + Antioxidantes.

**Dosis:** 5ml por litro o 8 gotas por cada 40ml de agua durante 5 días.

**8001** TABERNIL TOTAL 20ml



## TABERNIL VERMICIDA

**Indicaciones:** Tratamiento de las nematodosis producidas por los parásitos sensibles al levamisol.

**Vía de administración:** Oral en agua de bebida.

**Fórmula:** Levamisol .

**Dosis:** 2ml por litro o 2 gotas por cada 40ml de agua de bebida.

**8002** TABERNIL VERMICIDA 20ml



## BAXIDIN SPRAY

**Indicaciones:** En caninos, gatos, bovinos, equinos y porcinos como antiséptico de uso externo e interno, como desinfectante de instrumental quirúrgico y equipos de diagnóstico veterinario.

Fórmula: Clorhexidina Digluconero.

**Vía de administración:** Tópico.

**Modo de uso:** Aplicar puro sobre la superficie como: Antiséptico para heridas, quemaduras y/o ulceraciones en la piel, para uso vaginal, bucal (en gingivitis, alveolitis, estomatitis y placa dental) para el conducto auditivo externo, para preparación antiséptica prequirúrgica, desinfección de objetos inanimados (instrumental quirúrgico, equinos de diagnóstico). Diluir 1 ml de Baxidin en 20ml de solución estéril (solución 0,02% de Clorhexidina) para lavado antiséptico de pleura, peritoneo y quemaduras de segundo grado. Diluir 20 ml de Baxidin en 50 ml de Solución Salina estéril (solución 0,2% de Clorhexidina) para compresas.

**35009** BAXIDIN SPRAY 120 ML

**35010** BAXIDIN SPRAY LITRO



## Varios

### LOCIÓN PARA CASCOS

**Indicaciones:** Loción podal para cascos o pezuñas blandas y frágiles. Como tratamiento coadyugante en hormiguillo usese en equinos y rumiantes.

**Vía de administración:** Aplicar sobre la estructura podal 2 veces al día por 7 días. Asegúrese lavar el área previamente.

**Fórmula:** Formaldehído yodo.

**35003** LOCION PODAL 480 ML



### NEOCAN

**Indicaciones:** Indicado en caso de diarreas infecciosas o alimentarias y trastornos estomacales causados por cambios bruscos en la alimentación.

**Vía de administración:** Oral.

**Fórmula:** Neomicina + Caolín + Pectina + Belladona + Sulfaguanidina.

**Dosis:** Perros de 5 a 15ml. Gatos de 5 a 10ml. Repetir la dosis indicada cada 6 horas durante 3 días.

**35893** NEOCAN 120ml

**35007** NEOCAN 240ml



### GANAVERM

**Indicaciones:** Endoparasiticida de amplio espectro indicado para el control y tratamiento de parasitosis interna del ganado bovino, equino, ovino y caprino.

**Vía de administración:** Oral.

**Fórmula:** Albendazol + Sulfato de cobalto

**Dosis:** General 2ml por cada 45kg de peso vivo.

**35011** GANAVERM SUSP. 120ml

**35076** GANAVERM SUSP. 500ml

**35006** GANAVERM SUSP. litro



## NEOWELL

**Indicaciones:** Úlceras cutáneas, infecciones de la piel, quemaduras, heridas infectadas y abrasiones de la piel.

**Via de administración:** Tópica, Aplicar en capa delgada. (Puede cubrirse con gasa estéril).

**Fórmula:** Neomicina sulfato 150mg, Clostebol acetato 150mg.

**Dosis:** En capa delgada sobre la lesión una o dos veces por día.

**8010** NEOWELL



## KLERAT PELLET

KLERAT® es un rodenticida anticoagulante de segunda generación que controla eficazmente guarenes o ratas de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), ratas del tejado (*Rattus rattus*), lauchas o ratones (*Mus musculus*) y otras especies peligrosas y dañinas.

**20501** KLERAT PELLET SOBRE 20 grs



## Varios

### GALLOMIN

**Indicaciones:** Indicado para aves en crecimiento, sementales y hembras reproductoras de alto registro con vitaminas, hígado, aminoácidos y minerales.

**Vía de administración:** Oral directamente al pico, antes del alimento.

**Fórmula:** Complemento de vitaminas y minerales.

**Dosis:** 1 tableta diaria.

**35046** GALLOMIN 100 tabletas



### ENZY-BIOTIC

**Enzy - Biotic:** son enzimas digestivas con probióticos para perros y gatos. Está indicado en desórdenes digestivos, gases, mal olor, costumbre de comer heces, mal aliento, caída del pelo, restablecimiento de la flora intestinal, ayuda general a la digestión de proteínas, grasas y carbohidratos.

**Vía de administración:** Oral

**Dosis:** Gatos adultos y Perros hasta 12kg de peso: 1 tableta al día. Perros de más de 12 y hasta 23kg de peso: 2 tabletas al día. Perros de más de 23 Kg y hasta 45kg de peso: 3 tabletas al día.

**Fórmula:** Cada tableta contiene:

Lactobacillus acidophilus 2 billones ufc / gramo

Pancreatina 100 mg equivalente a :

Amilasa 10.000 Und/USP, Proteasa 10.000 Und/USP Lipasa 2.500 Und/USP)

**Presentación:** Frasco con 60 tabletas

**35012** ENZYBIOTI 60 tabletas



### HEMOFER- B12

**Indicaciones:** Suplemento nutricional con hierro y hemoglobina indicado para perros, Tabletas saborizadas.

**Vía de administración:** Vía oral directamente en la boca o pulverizarse en la comida o leche.

**Fórmula:** Hierro + Vitamina B12 + Hemoglobina.

**Dosis:** Razas grandes con síntomas agudos de anemia 2 a 3 tabletas diarias divididas entre la mañana y la noche, síntomas moderados 1 a 2 tabletas diarias. Razas pequeñas 1/2 a 1 tableta diaria.

**35691** HEMOFER B12 60 tabletas.



## BUDDY TABS (ENZIMAS DIGESTIVAS CON PROBIÓTICOS)

**Indicaciones.** Este producto contiene probióticos o bacterias beneficiosas que promueven una excelente absorción de los nutrientes y estimulan el sistema digestivo e inmunológico ayudando a restaurar la flora intestinal del animal. Coadyuvante en la digestión de proteínas, grasas y carbohidratos cuando acontece una deficiencia en el páncreas, coadyuvante en problemas de mal aliento y de flatulencias constantes.

**Presentación:** Frasco con 60 tabletas saborizadas

**Vía de administración:** Oral

**Fórmula:** Cada tableta contiene 25 mg de PANCREATINA 4 X USP, 2.500 Unid USP de amilasas, 625 Unid USP de lipasas, 2.500 Unid USP de proteasas y 50 mg de Lactobacillus Acidophilus.

**Especie:** Perros de razas pequeñas y Gatos

**Dosis:** Perros y gatos: 1 tableta por cada 2.5 kg de peso vivo al día.

35002 BUDDY TABS



## HEPATOCAN FORTE (PROTECTOR HEPÁTICO)

**Indicaciones.** Suplemento nutricional que estimula y regenera el tejido y la función hepática en perros de todas las razas y edades. Coadyuvante para el tratamiento de enfermedades agudas y crónicas del hígado, intoxicaciones por anestésicos, quimioterapias, antiparasitarios u otros tóxicos, prevención del hígado graso (lipidosis) que puede conducir a la cirrosis, minimiza los efectos secundarios de un hígado deficiente y con una actividad metabólica reducida, problemas digestivos y hepatobiliares.

**Presentación:** Frasco con 60 tabletas saborizadas

**Vía de administración:** Oral

**Fórmula:** Cada tableta contiene 100 mg de Silimarina (Cardo Mariano), 15 mg de Acido Alfa Lipoico, 10 mg de Hojas de Alcachofa polvo, 25 mg Mononitrato de Tiamina (Vit B1), 25 mg de Riboflavina (Vit B2), 25 mg de Piridoxina (Vit B6), 0.005 mg Cianocobalamina (Vit B12), 10 mg de Lecitina, 10 mg de Colina y 10 mg de L-Metionina.

**Especie:** Perros

**Dosis:** Suministrar 1 tableta por cada 15 kg de peso vivo. Razas grandes con síntomas agudos: Suministrar 3-4 tabletas por día en dosis divididas en la mañana y en la noche. Razas grandes con síntomas moderados o crónicos: Suministrar 2-3 tabletas divididas al día. Razas pequeñas: Suministrar 1 tableta al día.

35014 HEPATOCAN FORTE



Varios

## ARTRI-TABS

**Indicaciones:** Coadyuvante en el tratamiento de la osteoartritis, displasia, problemas articulares en perros y gatos. Tabletas saborizadas.

**Vía de administración:** Vía oral o mezclarse con la leche o la comida.

**Fórmula:** Glucosamina HCL + Condrotin Sulfato + Colágeno hidrolizado + MSM.

**Dosis:** Perros y gatos menores de 9kg de 1/2 a 1 tableta al día. Perros de 9 a 19kg 1 a 2 tabletas al día. Perros de 20 a 45kg 2 tabletas al día. Administrar la dosis total dividida en la mañana y en la noche.

35005 ARTRI TABS EXTRA STRESS



# EQUIPO MÉDICO

**DISTRIBUYE:**



## EQUIPO MÉDICO Varios

### AGUJA DESECHABLE

- 9909** AGUJA DESECHABLE 16X 1 1/2
- 9907** AGUJA DESECHABLE 16X1
- 9912** AGUJA DESECHABLE 16X1/2
- 9908** AGUJA DESECHABLE 18X1
- 35031** AGUJA DESECHABLE 18X1 1/2
- 9910** AGUJA DESECHABLE 18X1/2
- 9919** AGUJA DESECHABLE 20X1
- 9920** AGUJA DESECHABLE 23X1



### AGUJA EUROPLEX

- 35034** AGUJA EUR 16X1 1/2 CJA 12 UD
- 35037** AGUJA EUR 16X1 CJA 12 UD
- 35030** AGUJA EUR 16X1/2 CJA 12 UD
- 35039** AGUJA EUR 18X1 1/2 CJA 12 UD
- 35038** AGUJA EUR 18X1 CJA 12 UD
- 35040** AGUJA EUR 18X1/2 CJA 12 UD



### AGUJA VACUTEINER

- 9983** AGUJA VACUTEINER 20X1
- 9982** AGUJA VACUTEINER 20X1 1/2



## JERINGA EUROPLEX

- 35650** JERINGA EUROPLEX 10 ml
- 35652** JERINGA EUROPLEX 20ML



## JERINGA DESECH NIPRO

- 9915** JERINGA DESECH.NIPRO 1 CC
- 3002** JERINGA DESECH.NIPRO 5 CC
- 3003** JERINGA DESECH.NIPRO 10 CC
- 3004** JERINGA DESECH.NIPRO 20 CC
- 3006** JERINGA DESECH.NIPRO 3 CC
- 3007** JERINGA DESECH.NIPRO 30 CC
- 20864** JERINGA DESECH.NIPRO 50 CC



## JERINGA DESECHABLE

- 25202** JERINGA DESEC. KED 5 CC



## EQUIPO INTRAVENOSO

- 9911** EQ. INTRAV. DESECHABLE



## EQUIPO MÉDICO Varios

### SISTEMA VACUTEINER

#### DESCRIPCION:

**Tubos de plástico con tapón rojo**, con activador de coagulación aplicado por aspersión. Para química clínica y serología. La FDA recomienda para inmuno hematología.

**Tubos de plástico con tapón lila**, con EDTA-K2. Para determinaciones hematológicas con sangre total.

**Porta Tubos Vacutainer (Holder)**: De plástico transparente compatibles con las agujas y los tubos.

**Agujas Vacutainer**: Compatibles con todo el sistema Vacutainer. Con tecnología de punta para un mejor deslizamiento de la aguja en vena y medidas recomendadas para una muestra de calidad.

**9980** Rojo 9mL

**9981** Lila 4 mL



### MINI COLLECT

**9986** MINI COLLECT TUBO 0.5 ML



### GUANTES DE LATEX

**9903** GUANTES DE LATEX XS CAJA 100 UNI

**9916** GUANTES DE LATEX S CAJA 100 UNI

**9906** GUANTES DE LATEX M CAJA 100 UNI

**9905** GUANTES DE LATEX L CAJA 100 UNI



### GUANTES DE NITRILO

**9995** GUANTES DE NITRILO S

**9996** GUANTES DE NITRILO M

**9997** GUANTES DE NITRILO L



## EQUIPO MÉDICO Varios

### CAJA SUTURA ABSORBIBLE

- 9927** CAJA SUT. ABSORBIBLE #0
- 9935** CAJA SUT. ABSORBIBLE #1
- 9924** CAJA SUT. ABSORBIBLE #2
- 9926** CAJA SUT. ABSORBIBLE #2-0
- 9925** CAJA SUT. ABSORBIBLE #3-0



### CAJA SUTURA NYLON

- 9928** CAJA SUTURA NYLON #0
- 9929** CAJA SUTURA NYLON #2-0
- 9930** CAJA SUTURA NYLON #3-0



### HOJA BISTURÍ

- 9956** HOJA BISTURI#10 CAJ 100UND
- 9957** HOJA BISTURI#20 CAJ 100UND
- 9958** HOJA BISTURÍ#15CAJ 100UND



### CATETER NIPRO

- 9955** CATETER NIPRO 14X2
- 9954** CATETER NIPRO 16X2
- 9953** CATETER NIPRO 18X2
- 9952** CATETER NIPRO 20 X 1 1/4
- 9951** CATETER NIPRO 22 X 1
- 9950** CATETER NIPRO 24 X 3/4 D



## SELLOS DE HEPARINA

9970 SELLOS DE HEPARINA



## CAMPO OPERATORIO FENESTRADO

### DESCRIPCION:

Para su uso en procedimientos quirúrgicos o terapéuticos menores donde se requiere un campo estéril o una cortina. La construcción poli-interlineada de 3 capas proporciona absorción de sangre y fluidos previniendo la posible migración de humedad o bacterias a las áreas quirúrgicas. Los campos operatorios estériles miden 46 cm X 66 cm con fenestración de 7.6 cm.

**PRESENTACIÓN:** un campo operatorio estéril por paquete

9942 ESTERIL



## CAMPO QUIRÚRGICO

9943 CAMPO ESTÉRIL



## ALGODÓN

9914 ALGODON BOLITA 100UND

9904 ALGODON 500 GRS (ROLLO)



## GASA NO ESTÉRIL

**9923** GASA NO EST. 4X4X16 100UND

**9921** GASA NO EST. 4X4X16 200UND



## GASA ESTÉRIL

**9922** GASA EST. 4X4 100UND



## VENDA COBAN

### DESCRIPCION:

Los rollos de vendaje autoadhesivo sensi wrap de 2 "x 5 yardas proporcionan un vendaje de compresión liviano que se adhiere a sí mismo, no a otros materiales ni a la piel. Se rasga fácilmente sin el uso de tijeras. No se desliza, por lo que mantiene la posición, hay disponibilidad en color morado, verde y piel.

**PRESENTACION:** Unidades individuales empacadas en bolsa hermética.

**9975** VENDA 3 PULGADAS



## COLLAR ISABELINO

- 35016** COLLAR ISAB. 7.5 CM
- 35017** COLLAR ISAB. 10 CM
- 35018** COLLAR ISAB. 12.5 CM
- 35019** COLLAR ISAB. 15 CM
- 35020** COLLAR ISAB. 20 CM
- 35021** COLLAR ISAB. 25 CM
- 35022** COLLAR ISAB. 30 CM



## APLICADORES

**DESCRIPCION:**

Aplicadores de 15 cm de largo, de madera con punta de Algodón, dispositivo médico no estéril, diseñado para facilitar la aplicación de medicamentos tópicos y/o exploración física de órganos externos.

**PRESENTACIÓN:** Bolsa tipo ziploc con 100 aplicadores

**9960** DE MADERA 6 PULG



# ACCESORIOS PARA MASCOTAS

**DISTRIBUYE:**



# PERROS Y GATOS



Comprometidos con el bienestar de sus animales

**CASAS Y TRANSPORTADORAS**

**ANCHO:** 27 cm

**LARGO:** 42 cm

**ALTO:** 31,5 cm

**1038** TRANSPORTADORA DE LUJO  
(639WO)



**1034** TRANSPORTADORA  
LIMOSINA



Perros y Gatos



**ANCHO:** 21 cm

**LARGO:** 34,5cm


**ALTO:** 27 cm

**1036** CANASTA TRANSP.  
MASCOTAS(623WO)

**CAMAS Y COBERTORES**

- 1047** Cama plast con cojín peq (669)
- 1048** Cama plast con cojín med (668)
- 1049** Cama plast con cojín gde (667)

**ANCHO:** 48 cm  
**LARGO:** 66 cm  
**ALTO:** 21,5 cm



**ANCHO:** 32.5 cm  
**LARGO:** 46.5 cm  
**ALTO:** 18,5 cm

**ANCHO:** 40 cm  
**LARGO:** 55 cm  
**ALTO:** 20 cm



**25210** Cama Litera

**COMEDEROS**

- 1061** Comedero plast. redondo peq (265a)
- 1062** Comedero plast. redondo med (263a)
- 1063** Comedero plast. redondo gde (263a)



**COMEDEROS**

**1060** Comedero antideslizante redondo



**1056** Comedero antideslizante cuadrado peq

**1058** Comedero antideslizante cuadrado gde



**96120** Comedero doble pequeño



**25404** Comedero esmaltado/huella 30cms #5

**25405** Comedero esmaltado/huella 34cms #6



**COMEDEROS Y BEBEDEROS**

**1075** Bebedero y comedero mediano

**1076** Bebedero y comedero grande



**1071** Comedero kitty y doggy (683f)



**1073** Bebedero kitty y doggy gde (683w)



**VARIOS**

**1090** Biberón con kit completo (649)



**1080** Botella portátil 360 ml



**VARIOS**

**25216** Corta uñas con lima



**1069** Pala para mascotas



**1054** Arenero gato de lujo con pala



**ANCHO:** 40 cm  
**LARGO:** 50 cm  
**ALTO:** 19 cm

**1052** Arenero gato peq



**ANCHO:** 31 cm  
**LARGO:** 41 cm  
**ALTO:** 11 cm

## Perros y Gatos

### 1052 ARENERO CERRADO PREMIUM



**ANCHO:** 38 cm  
**LARGO:** 52 cm  
**ALTO:** 43 cm

### 2550 CATNIP TUBO 30 gramos

**Descripción:** Pertenece al género *Nepeta* y a la especie *Nepeta Cataria*. Se le conoce también como hierba gatera, menta de los gatos o albahaca de gatos.



**JUGUETES**

**1106** Bola Juego Mascota



**CEPILLOS**

**7630** Rasqueta confort



## COLLARES

**65110** Collar nylon triple súper #18



**65109** Collar nylon doble liso #17



**65108** Collar nylon doble liso # 16



**65105** Collar nylon doble liso # 15



**65104** Collar nylon liso # 14



**65103** Collar nylon liso # 13



**65102** Collar nylon liso # 12



**65100** Collar nylon liso # 11



**65101** Collar nylon liso # 10



**COLLARES**

**65118** Collar american cascabel # 10

**65119** Collar american cascabel # 11



**COLLARES**

- 65215** Collar ajustable american 1/2"
- 65221** Collar ajustable american 3/4"
- 65222** Collar ajustable american 1"



- 65404** Collares Delux 1/2"
- 65405** Collares Delux 3/4"
- 65406** Collares Delux 1"



- 65116** Collar usa 1/2"
- 65117** Collar usa 3/4"
- 65115** Collar usa 1"



- 65201** Collar nylon relieve # 1
- 65202** Collar nylon relieve # 2
- 65203** Collar nylon relieve # 3



**CORREAS**

**65703** Juego huesito usa ½"

**65704** Juego huesito usa ¾"

**65705** Juego huesito usa 1"



**65400** Juego Delux ½"

**65401** Juego Delux ¾"

**65402** Juego Delux 1"



**65600** Juego american liso ¾"

**65603** Juego american liso 1"



**65521** Juego american combi ¾"



**65602** Juego american relieve ½"

**65605** Juego american relieve ¾"

**65604** Juego american relieve 1"




**65770** Juego american ajustable ¾"



**CORREAS**

**65500** Correa City pequeña

**65501** Correa City mediana



**65450** Correa corta con sacavuelas bronce 1"



**75106** CORREA BULL BRONCE CORTA

**75109** CORREA BULL BRONCE LARGA



**35236** Correa huesito usa 1/2"

**35237** Correa huesito usa 3/4



**65111** Correa City doble



**75107** CORREA BULL PLATA CORTA

**75112** CORREA BULL PLATA LARGA



## Perros y Gatos

### CORREAS - PECHERAS

**85500** Correa nylon lisa ½"

**65420** Correa nylon lisa ¾"



**65796** PECHERA USA #0

**65797** PECHERA USA #1

**65798** PECHERA USA #2

**65799** PECHERA USA #3

**65800** PECHERA USA #4

**65801** PECHERA USA #5



**65300** PECHERA NYLON LISA #0

**65791** PECHERA NYLON LISA #1

**65792** PECHERA NYLON LISA #2

**65794** PECHERA NYLON LISA #3



**65807** Bozal nylon #1

**65808** Bozal nylon #2

**65809** Bozal nylon #3



**BOZALES - COLLARES**

- 30103** Bozal perro #1
- 30102** Bozal perro #2
- 30104** Bozal perro #3
- 30105** Bozal perro #4



- 30205** Collar cuero forrado 1/2"
- 30210** Collar cuero forrado 3/4"
- 30215** Collar cuero forrado 1"
- 30220** Collar cuero forrado 1 1/4"
- 30225** Collar cuero forrado 1 1/2"



- 30500** Collar cuero picos 1"
- 30501** Collar cuero picos 1 1/4"
- 30502** Collar cuero picos 1 1/2"



- 30216** Collar cuero perro fuerte



- 30110** Collar cuero ajustable 1"
- 30115** Collar cuero ajustable 1 1/4"
- 30120** Collar cuero ajustable 1 1/2"



**PECHERAS - COLLARES**

- 30042** Collar zafiro 1 ¼"
- 30041** Collar zafiro 1"
- 30040** Collar zafiro ¾"



- 30321** Collar de cuero para adiestrar 1 ¼ pulg
- 30320** Collar de cuero para adiestrar 1 pulg



- 30240** Pechera cuero forrada #8
- 30242** Pechera cuero forrada #10
- 30244** Pechera cuero forrada #12



- 30218** Pechera cuero perro fuerte.



- 30053** Pechera zafiro grande 1 ¼"
- 30052** Pechera zafiro mediana 1"
- 30051** Pechera zafiro pequeña ¾"



**CORREAS**

- 30311** CORREA CUERO PLATA CORTA
- 30314** CORREA CUERO PLATA LARGA



- 30310** CORREA CUERO BRONCE CORTA
- 30312** CORREA CUERO BRONCE LARGA



**COLLARES - CADENAS**

- 2165** Collar metal doble plus #20
- 2166** Collar metal doble plus #25



- 2150** Collar-cadena ajustable (2en1) 16cm



**COLLARES - CADENAS**

- 25010** Collar de metal ajustable #12
- 25011** Collar de metal ajustable #14
- 25012** Collar de metal ajustable #16
- 25014** Collar de metal ajustable #20
- 25015** Collar de metal ajustable #22



- 2155** Collar metal doble lujo #20
- 2156** Collar metal doble lujo #25



- 2020** Cadena galvanizada superior # 16
- 2021** Cadena galvanizada superior # 20
- 2022** Cadena galvanizada superior # 25
- 2023** Cadena galvanizada superior # 30
- 2024** Cadena galvanizada superior # 35
- 2025** Cadena galvanizada superior # 40




- 2001** Cadena lujo huesito 16x48
- 2002** Cadena lujo huesito 20x48
- 2003** Cadena lujo huesito 25x48
- 2004** Cadena lujo huesito 30x48
- 2005** Cadena lujo huesito 35x48
- 2006** Cadena lujo huesito 40x48



# ROEDORES

DISTRIBUYE:



## Roedores

### CASAS - JAULAS

**25006** Jaula Hamster mediana



**25005** Jaula Hamster pequeña



**BEBEDEROS**

**1082** Bebedero roedores 200 CC



**1081** Bebedero conejo litro



**BOLAS**

**1050** Bola roedores pequeña



# AVES

DISTRIBUYE:



**BEBEDEROS**

**25406** Bebedero para Colibrí



**1022** Bebedero p/pájaros 100 ml (302)

**1024** Bebedero p/pájaros 200 ml (301)



JAULAS

25021 Jaula mediana

**ANCHO:** 28,5cm  
**LARGO:** 35 cm  
**ALTO:** 46 cm



25020 Jaula pequeña

**ANCHO:** cm  
**LARGO:** cm  
**ALTO:** cm



# EQUIPO AVÍCOLA

DISTRIBUYE:



## Equipo Avícola

### BEBEDEROS

- 1015** Bebedero tipo bola 600 ml (117)
- 1017** Bebedero tipo bola 1.3 litros (116)



- 1010** Bebedero c/agarradera 1 gal. (122)
- 1009** Bebedero c/agarradera 2 gal.(119)



- 25205** Bebedero para pollo goteo 12 und



- 1018** Bebedero tipo hongo 2.5 lts



## COMEDEROS

**1001** Comedero p/aves 1.5 kg (127a)

**1003** Comedero p/aves 3 kg (126a)

**1005** Comedero p/aves 5 kg (124a)

**1006** Comedero p/aves 8 kg (121a)



**1014** Comedero multiple p/aves (339)



**1019** Comedero rect. P/ pollito



# EQUINOS

DISTRIBUYE:



**VARIOS**

**25002** Soga nylon pekos 15 varas

**25004** Soga nylon pekos 18 varas



**2060** Sacavuelta bronce mini 3/8"

**2061** Sacavuelas bronce peq 1/2"

**2062** Sacavuelas bronce med 3/4"

**2063** Sacavuelas bronce gde 1"

**2064** Sacavuelas bronce gde 1 1/4"



**25090** Junta cadena acero 4MM

**25091** Junta cadena acero 5MM

**25092** Junta cadena acero 6MM

**25093** Junta cadena acero 7MM



DISTRIBUYE:



# Ganadería



**25003** Niple acero cerdo



**85811** Areteadora



## Bovinos

**85880** Aretes sin número Pequeños

**85813** Aretes sin número Medianos



**85814** Aretes numerados Pequeños

**85812** Aretes numerados Medianos

**85886** Aretes numerados Grandes



**85900** Pilot



DISTRIBUYE:


# Herramienta Agrícola



## Herramientas Agrícolas

### CUCHILLAS

**96005** Cuchilla motoguadaña 35x1 gruesa 3901-54



**96063** Cuchilla picapasto 3 huecos grande

**96062** Cuchilla pasto 3 huecos mediana #3779





**2241-3636**  **8890-5858**

**Navet Internacional S.A**

 **navet\_internacional**

 **info@navetsa.com**

 **www.navetsa.com**